

après avoir été occupé  
de l'immuabilité générale  
de l'inflammation nous allons  
parler de chaque inflammation  
particulière nous nous occuperons  
d'abord de l'érysipèle. On se présente  
certaines affections inflammatoires  
matérielles, membraneuses  
ou muqueuses  
séreuses.

# De l'Erysipèle

L'érysipèle est tout d'abord de la  
pathologie interne que de l'externe. Car dans  
l'inflammation les médicaments interviennent  
+ agissent quelquefois sur le lieu de l'érysipèle  
lorsque le Phénomène qu'il présente. On le fait  
deux degrés Ερυθρελμα qui signifie ΡΕΡΥΘΡΟΝ  
l'arrose et Πελας l'écaille. Parce que cette maladie  
donne l'aspect q. q. fois de rochers en rochers, mais  
ce n'est dans l'étiologie qu'il y a une base d'examen.  
(Hofmann) la définit febris erysipelacea est  
part des anciens l'ont appelée febris autumna  
mal de cadens. Tanner. L'appelle erysipela  
hedrosa vaucheliana apostolica de son saint  
quel est une maladie morbifique. Est part  
l'ont rapporté à la classe des exanthèmes  
l'ont tout d'abord Sauvages et autres l'ont  
mise en out fait un genre d'articulation de l'infla-  
mation les Caractères généraux de l'érysipèle  
sont les suivants l'érysipèle est une inflammation  
certaine non circonscrite avec ou sans  
fièvre la durée est longue et l'ordre - Considérable  
q. q. fois elle cause une douleur considérable et  
une chaleur avec la fièvre et l'écaille ont  
rouge ardoise qui q. q. fois l'ont vu les jaunes  
et sont le même état rouge disparaît à la  
la guérison et repaît de la fièvre lorsque  
l'on cesse de traiter. et est par ordinaire-  
ment accompagné de subordination locale



(Cause) externe et (Cause) interne  
L'erysipele est Cause externe et reg. en de coque  
une affection purement locale, produit par Cause  
interne il devient une affection purement  
Le Cancer l'erysipele soivent être (général)  
en ordre, osant, let en excitation.

[illegible]

gras et rancie les piet sont secher.  
Leur partie couverte de poil se couvrent de boue  
beu. Mais trop chaude le bain. Non chargie  
de pluie, il aere. et imitant la nature de  
aliments la maniere doit estre employe, les  
aliments gras. chez les indiens d'un exemple  
meut billez le usage des aliments salis trop  
epice peuvent produire l'erysipiele.  
Notons que l'estoit de la maniere de  
que des aliments trop salis pour d'autres peuvent  
y donner lieu. tel fait est ainsi pour les  
et ceux habitant la zone, les exerce trop  
violente, ceux fait a Soleil trop chaud  
les exerce trop d'insuence. ou supprime la  
suppression de la transpiration et de la transpiration  
ainsi que chez les flux hémorrhoidal. Certaine affe-  
tion de l'ame. flatte que la Colere violente  
peuvent estre regardie comme cause d'ery-  
sipele. de l'erysipiele qui sont survenus l'organe  
-ment au Recede d'embarras. Castrique, Colique  
rapporte. avoir vu une femme qui chagrie, Colique  
qu'elle se mettait en pelée. etait atteinte d'un  
erysipiele + on a interne suvant le degre de la  
Colere, jusqu'à tout les agents chirurgicaux d'hygiène ou  
médicaments peuvent se proposer à l'erysipiele.  
Les causes pathologiques sont toutes de l'ery-  
sipele sont les causes anagastiques. surtout la  
dillence, le ven interne, la suppression  
brusque de la goutte ou rhumatisme ou  
l'erysipiele sont survenus. Pour qu'on puisse  
deviner la cause soit interne soit externe  
l'erysipiele est une maladie typhoïde et est.



[illegible]

Causes est externe il se termine rarement par  
gangrene par suppuration et par cicatrisation  
La mort de cet erysipe est ord. peu fréquente  
La Cause étant facile à détruire les erysipelles  
locaux sont peu. intérieurs, les gangreneux sont  
un peu plus fréquents les erysipelles simples sont  
dangereux par exemple ceux qui attaquent le  
visage chez un individu jeune et exposé aux  
congestions sanguines.

Le traitement de cet Erysipèle est très simple  
il faut d'abord détruire la Cause si on ne peut le  
détruire il faut au moins la diminuer. Suppression  
des erysipelles par le frottement d'onguent mercuriel  
saes. il faudra le frotter avec de l'eau tiède en  
causant. Il faut se soigner d'un erysipèle causé par une  
piqûre enfoncée dans la peau quelque chose, l'écarter  
avec un peu de laide de l'intérieur, ensuite on cause l'irritation  
par le sédatif et le reprenant tel que l'irritation  
l'eau végétale minérale et la solution de sulfate de  
zinc. Il est peu d'intérieur on associe les meilleurs  
autres solutifs les Cataplasmes, on l'a vu avec succès  
fatigueux par leurs piquets. La partie irritée, le repos  
de la partie est la cause d'une exaction nécessaire  
Il faut encore prendre des précautions pour que le  
malade ne soit point exposé à une Cause irritante  
Il est accompagné de fièvre ou en l'absence de  
fièvre les boissons acidulées aux lavements émollients  
et laxatifs le régime général est alors indiqué cette  
espèce d'erysipèle est rarement et même jamais  
accompagnée de crises.

Une seconde espèce d'erysipèle est l'erysipèle bilieux  
Il est plus fréquent il est occasionné ordinairement

Parce Cause agissant sur les viscères intestinaux  
d'autre part il peut être Cause, par une  
Cause qui aura porté son action sur de l'organe  
important à la vie qui soit en rapport avec le foie et  
erysipèle est fréquent. en ce que dans l'autre  
raison. il peut s'en venir au contraire, mais c'est  
alors moins intense et peut être Cause par tout le  
système qui facilite la sécrétion de la bile et de la bile  
qui causent l'irritation du foie et l'estomac. il s'ensuit encore  
à la suite de plusieurs de ces causes l'ordre  
proprie de la vie par la sordide à l'acide du foie  
par le le voir l'humidité chez des individus blessés  
et qui auparavant étaient disposés à l'embarras gastrique  
ainsi dans le cas d'est. f. ainsi d'une Cause par le  
trouble seulement.

L'erysipèle bilieux a des symptômes bilieux  
précursifs ce qui le diffère du précédent qui n'en  
a point ces symptômes précursifs sont les  
nausées et sont en suite

(Chaleur et irritation du sein le malade éprouve  
un malaise général il est dans l'état d'inquiétude  
il y a une douleur vague dans le membre  
il se plaint encore de plusieurs inégales de saignée  
ou vomissement q. q. fois la diarrhée d'autre fois  
la constipation q. q. fois est erysipèle et blême  
d'auressie d'autre fois de digout et de purgation  
toujours produit la Cause naturelle, est erysipèle  
est Cause du trouble de la sécrétion de la bile  
qui devient rougeâtre il peut être précédé d'un lumbago  
ment involontaire de l'ophtalmie, d'opoprysmes et d'ac-  
tion d'un léger écoulement qui se fait de suite et souvent  
dans ceux de ces affectes le Cui chavale le visage  
à l'apoplexie qui est en suite et le mal.

1 Lorsque l'erysipele d'ailleurs se déclare le malade éprouve du gonflement au der. sur tout au visage qu'une céphalalgie, s'il est à l'intérieur le gonflement est d'ord. fréquent, la peau est bachelée q. q. fois sèche et se descolle q. q. fois avant la fièvre mais rarement, les symptômes locaux de l'erysipele sont le suintement de la malade, pour ainsi dire la partie enflammée au commencement des symptômes, bientôt et est accompagnée de douleurs vives, d'une chaleur violente et grande des environs, s'y joignent un gonflement + on — Considérable La partie enflammée est d'un rouge vif, dont la circonférence s'étend insensiblement + on — tendue. en même temps que les symptômes locaux augmentent les symptômes généraux deviennent de l'intensité

Cette espèce d'erysipele se termine ordinairement par résolution q. q. fois par élévation d'un abcès ou avec metastase d'autre fois il se déplace et se porte sur l'autre organe d'autre fois au sein et se termine par résolution pour la partie primitivement affectée et attaque ensuite la partie voisine à — que les symptômes inflammatoires ne soient terminés et se termine très rarement par suppuration et par gangrène.

Cet erysipele est agénéral ou général surtout lorsque la cause est commune et combattue dès son principe, peut cependant devenir fâcheux si l'attaque se complique surtout l'extension du visage du cou, ou de la poitrine, lorsqu'il se termine par métastase et lorsqu'il est compliqué de q. q. maladies fébriles et peut encore être fâcheux.



La douleur faite avec cela Coule de l'air c'est un  
Soulage. En adjoignant la matière a ce et en creusant  
la partie du Contact de l'air. Le temps que dans cette  
inflammation sont en général peu étendu, on voit de  
lors qu'on en emploie et il doit avoir pour but  
de étendre la partie dans un diminue l'irritation  
et orgueille. Le traitement ordinairement de résolution  
et avec orin qui se fait soit par diarrhée, soit par  
le crachats ou par l'hémorrhagie qui peut  
avoir lieu par l'apostrophe de la flux menstruel  
cette Crise peut avoir lieu par l'urine qui  
devient lactescente et dont le sédiment est  
abondant et grisâtre.

Lorsque cet orgueil est terminé il faut en réveiller  
la nouvelle en adjoignant la liberté de l'air par  
des purgations de lavement et de bain  
étiolés on fait prendre au Convalescent un exer-  
cice modéré, on fait de fréquents exercices  
pourvent la transpiration et sont très avan-  
tageux.

Acte de l'individu. Chez lequel cet orgueil  
est périodique il faut alors vacquer le malade à  
peu près autant qu'il soit le manifeste, si malgré cela  
il survient de l'asthénie.

Si l'orgueil bilieux est accompagné de symp-  
tômes d'asthénie l'attaque l'orgueil est ordinairement  
Vie. C'est alors dangereux celui qui attaque par exemple  
le cuir chevelu peut traverser le cerveau et  
même le diaphragme et aller jusqu'à lui cela peut  
arriver après la suite de celui qui d'abord par le  
de l'air le danger d'aller à l'air est grand et est  
important de le modérer par la diète rigoureuse le  
rythme absolu et même appliquer des sangsues.

11  
 Saigne sur le paracétide, la saignée générale  
 devient nécessaire ou la saignée du bras ou le  
 ordinaire ou le singulier. On doit aussi avoir recours  
 à l'emploi de l'acide que l'on agit avec du safran  
 volatile abondant afin qu'il soit irritant il doit être  
 continué longtemps. On doit aussi éloigner de malade toute  
 cause constante telle que la visite la conversation etc.  
 La saignée ne soulage par ou en pratique, l'écoulement  
 de l'emploi du singulier et le vin de Bordeaux  
 que aux jambes ou aux cuisses des vénériens  
 et aux jambes on peut les appliquer à la verge  
 On peut les appliquer sur la partie enflée mais  
 ce moyen est peu sûr, la plaie du vénérien  
 jointe à celle des autres est très dangereuse, les bords  
 de la plaie, les sinapismes, les ventouses  
 scarifiées peuvent être utiles il faut insister sur ce traite-  
 ment jusqu'à la disparition de l'écoulement  
 urinaire.

La Couvalasceue est ordinairement très longue elle peut même durer deux ans si est en siége l'atragie les urinaux d'une femme. Il faut encore au jeune d'exige la même traitement au après par si l'atragie d'ailleurs la femme des d'ailleurs même d'ailleurs en surveillant le malade et en évitant les accidents on ne doit être en crainte qui au bout de 6 ou 8 jours on voit le malade à régime rigoureux ou facile l'expectation active on excite la transpiration.

Il est terminée l'ardente avec un état de fièvre. Il faut la rappeler au siège primitif et le malade s'en va abandonner la peau pour le porter à la fleur au l'occurrence du cas.

On applique sur le pithu primitivement affecté

Des vésicatoires volans ou sont faits de poution  
avec du bœuf forcé et duré par pout fain  
employer leau chaude le ventouse sèche et  
charrier et de bain scarifier au employe 1 dict  
si dure et 1 quinte en la vege.

Si l'inflammation erysipeleuse se fixe sur la langue  
secondairement affecté et quel ce veuille d'ant se rendre  
l'ou d'ice. Finient il faut combattre cette inflammation  
comme une inflammation finitive quoique Conden-  
tive. C'est adire s'il attaque le plevre ou le  
grande plevre une pleurésie le plevre comme 1  
parjennement.

Lorsque est erysipele bilieux et assez intense par le  
terme de l'at suppuration on peut employer le topique  
emolient. mais il faut s'en servir - localiser 1  
se forme l'abie. Pour l'ore lorsque est une et quoique  
soit très intense on ne doit pas faire l'ouverture  
etendue parce que le contact de l'air et le danger  
d'une de l'oreille si l'ouverture est d'un plevre  
et faite dans l'endroit le + exilive elle est suffisante  
Cet erysipele se termine rarement par gangrene  
elle se casse d'un seul, s'il est très intense et par conséquent  
de plevre aduamigal ou a l'oreille - erysipele de l'oreille  
admet. Dans le 1<sup>er</sup> cas on emploie les anti phlogisti-  
ques, et la evacuation dans le 2<sup>o</sup> on emploie accou-  
ler le sang et la evacuation mais avec beaucoup de  
réservé.

Une autre complication de l'erysipele est donc l'erysipele  
complicé de plevre finitive. C'est fréquent. que le  
ou une plevre finitive, et est souvent assez fréquent dans  
le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>o</sup> autours humides. On a vu souvent dans  
au d'ant une et au l'oreille l'attaque de plevre finitive



13  
vieillesse, des individus faibles et ceux d'un tempérament  
lymphatique. qui ce pendant ont tempérament athlétique et est  
constamment frappé de Cause qui agit par de manière à  
produire une débilité latente, si je ne s'agit d'un individu, au 1865  
ou l'âge à paraître attaquer. tout ce malade est l'hôte d'un  
et de plusieurs individus faibles et les vieillards et l'attaque  
ordinaire est la tête, la respiration, la voix, le cœur, les  
membres supérieurs et inférieurs. Et si je ne s'agit d'un  
jeune homme la Cause est la tête, par l'effacement d'un  
membre, par la pleurésie, d'arriver à fin ou la voix et les  
membres. Prendre le Caractère de l'individu d'éléments ou de  
Circulation par le traitement des symptômes.  
L'individu adynamique a des symptômes fréquents  
de la tête sont une céphalalgie profonde, il y a  
anorexie, la bouche est pâteuse, au sein le malade éprouve  
des douleurs. de l'effigie, il y a une couleur rouge  
l'aspect spontané et une respiration douce et tra-  
quée, ainsi qu'une inquiétude subite au sein de la tête et  
fréquence inégale et une horripilation la fait sen-  
tir.

Les symptômes la cause sont. D'abord une rougeur vio-  
lette ou brune. Comme celle des engelures, elle peut être  
uniforme ou inégale et même vultueuse le malade éprouve  
une douleur profonde mais + supportable que celle de l'ery-  
sipe. Précédant la chaleur est une couleur rouge mais le  
quelquefois est + considérable la durée est moins constante  
et reçoit q. q. fois l'effigie du doigt le doigt est  
fréquent mais faible. On développe la cause qui y cause  
le malade est anorexie il y a une couleur rouge vultueuse  
fréquent et sans effort la miction rendue est fré-  
quente au bout de q. q. jours le doigt devient + fréquent  
la langue est blanche fuligineuse, l'haleine est fétide  
l'écoulement de la miction est d'un rouge. fœtal et répand  
une odeur fétide, le malade est attaqué de la consti-  
pation q. q. fois de diarrhée la miction rendue est

Verdâtre, ou noirâtre et d'une odeur insupportable. Le  
peau est sèche et couverte d'une humeur visqueuse et  
mélée à laquelle sont des doctes. Nid. Et est coulé  
en supuration avec une la position qu'on lui donne  
est d'usage d'oxygène et d'un + longue durée que les  
autres, dont nous avons parlé d'usage se termine qu'on a vu  
le 11<sup>o</sup> jour et a q. q. fois jusqu'au 3<sup>o</sup> de la semaine  
et se termine rarement par resolution. q. q. fois il se  
termine par suppuration la par est peu consistante.  
Il est floconneux et a l'odeur d'acide acétique même  
sans le contact de l'air. q. q. fois il se termine par gangrène  
ou du tissu charnu sous cutané et même de l'infestation  
ou d'un virus calaire se finit et se termine par gangrène

Cet oxygène est très facile. Et d'origine d'air d'acide  
très de l'état général. a son début au baragasin  
premier et est insupportable d'employer pour cela les  
moyens les - et on ne peut l'éviter d'usage. Nant même  
qu'il se termine après q. q. Nouvellement. Il y a  
un baragasin est affaibli ou en l'état de purgatif acide.  
- la. La crême de tartre de laque d'air de l'état d'acide  
de l'eau d'orge, sur cette eau se vient l'acide d'air  
soutient en jours ou se vient l'altération de  
l'air et on. C'est et les symptômes par le bois  
- sont acideux légèrement bruyant, toutes les  
de l'acide de quinquina, acide avec de l'acide  
curative le vin étendu, d'eau. les infusions de  
Cassia melle de petite coramée le syrop de groseille  
et de framboise.  
Si les symptômes putride. l'antiseptique ou  
employé la decoction et l'extrait de quinquina et son  
forte et la Camphre en pilule.  
Par ces d'acide en l'acide ou l'acide appliqué des topiques  
resolutifs et la que l'infusion de l'acide, si la  
forte et est l'acide ou l'acide q. q. fois de l'acide

(18)

et même du vin au bon air, employez des decoctions  
aigre légères et acides. Si l'infestation est très  
vive on applique sur la partie enflammée du Cataplasme  
émoussé et résolutif une fois la suppuration formée on  
curiel abais. et on Comprimé la saignée. (Sous la  
peu. qui est accumulée. On infiltre) on doit ensuite faire  
le saignement fréquemment et promptement ou saigner  
recourir aux Émoussés, le infusion de melilot,  
des decoctions de quinquina. qu'on saigne avec de  
l'acide muriatique si la peau coube on a beaucoup gangrene  
Au bout de cet erysipèle on doit faire usage d'une diète  
rigoureuse. jusqu'à ce qu'il soit parvenu à la guérison  
cette diète doit être modifiée suivant l'âge du sujet  
Si l'infestation prompt se termine par suppuration  
on peut rendre au malade du Crème de Peau de  
et l'on le substance animale et le vin (la petite  
dose), malgré cela il arrive que le régime et l'usage  
de l'obéir ne modèrent point la suppuration, elle s'étend  
distingue le membre et parvient une fièvre tétanique et  
le malade s'évanouit et est du Cas ou le seul moyen  
à employer. est l'amputation du membre qui doit  
être employé que lorsque le malade peut supporter  
l'opération, doit fournir au fait de la dissection  
l'on ou la diète que toujours au patient saigner  
il arrive encore que le malade après l'amputation  
éprouve la gangrène du membre  
Pour ces dangers ne doit point saigner (comme  
on le voit par l'erysipèle) mais bien par la saignée  
et par la Comblement  
le traitement de cet erysipèle doit être modifié  
d'après certaines circonstances, la gravité de cette  
maladie et en rapport de son étendue et de son  
quelque étendue + on le traite comme suit.  
Si l'on pouvait concentrer le malade à la charnière  
en l'absence d'inflammation il y a encore  
cela serait avantageux et on pourrait la faire par

un varicatoire appliqué au centre de la brèche  
ou 1 fer rouge.

L'application d'un varicatoire détermine une  
forte inflammation il se forme un apoplexie de phleg-  
me et dans les cas heureux l'organe se  
à la circonférence, mais je n'ai jamais vu de  
de ce cas. si l'on applique le fer rouge et fait  
donner à l'intérieur de quinze à dix-huit  
de vin rouge, si l'estomac est encore affecté  
de la même manière de l'aliment ou aléatoire.

Ce traitement est rationnel mais il n'est pas  
par les observations qu'il soit bon.

L'erysipèle peut être contagieux et d'une mala-  
die locale notamment du phlegme et d'  
l'edème que nous avons vu après que  
nous parlerons de celui qui est appelé fœur et qui  
est une espèce d'erysipèle tout à fait différente  
des autres.

L'erysipèle phlegmoneux s'attaque le plus  
l'erysipèle simple sans cause mécanique  
et chimique. on peut être occasionné par  
cause interne il attaque la superficie du tégument  
qui contiennent beaucoup de tégument et de  
tout le visage le cou, les avant-bras, le  
la marge de l'aune la partie interne de l'anus  
des jambes.

Il y a une fois et d'autre en attaquant la peau d'un instant  
d'autre fois c'est la tégumentaire qui est affectée la  
de la on l'appelle phlegmon erysipélète, lorsque  
le phlegmon inflammatoire est interne dans  
le tégumentaire que dans la peau et dans la  
containe. erysipèle phlegmoneux  
On a vu erysipèle sans cause d'air d'autre fois  
ce sont des éruptions ganglionnaires et intestinales qui  
font donner lieu ou le reconnaît aux caractères

La peau est d'un rouge + foncé que d. l'erysipèle.  
Simple cette rougeur est + persistante elle ne  
disparaît point par la pression la chaleur est  
assez forte même - avec qu'on a l'erysipèle  
Simple la douleur est - vive et sans fin le gon-  
flement est + considérable et s'étend jus qu'à  
toute la partie touchée cette partie se couvre  
d'une croûte qui est dure, boursouflée et qui  
guérit que celle d. l'erysipèle simple.  
L'q. fois l'erysipèle ad. Simple se résout  
il est alors dit par cause interne.

Il est précédé d'une fièvre assez forte et inflama-  
toire que toute autre fièvre essentielle la rappelle.  
- que qu'on a la maladie est - vive qu'on a  
l'erysipèle d'ailleurs à l'extérieur de la bouche  
ou à l'intérieur de la surface interne de la langue  
est - jaune que dans ce dernier si l'inflammation  
est intense la langue est rouge et boursouflée la  
peau halitueuse, l'urine est foncée et la  
maladie est souvent affectée de Constipation  
rarement de Diarrhée.

L'erysipèle phlegmonieux se termine par  
résorption d'autre fois par résolution et suppu-  
ration q. q. fois il se termine par gangrène et  
rarement par induration à moins qu'il n'atte-  
igne un organe glanduleux.  
Dans l'erysipèle phlegmonieux tout  
chose - d'ailleurs est + fâcheux que l'erysipèle  
Simple il est occasionné par cause interne et est  
encore + fâcheux lorsqu'il est accompagné d'un abcès.  
Il est adhésif que on a l'erysipèle d'ailleurs  
lorsque l'erysipèle phlegmonieux est un peu on le combat par  
l'application d'opium résolutif, le traitement se fait  
employant l'opium baigné localement et plus tard.

8) Les écoulements sont employés adon + forte que les  
résolutifs. Lorsque l'inflammation attaque particulière-  
ment le testicule levez et la Dute sont indi-  
qués, adon favorisera le libre de Canal intestinal  
ainsi que la sécrétion de l'urine

S'il se forme de la suppuration on ouvre l'abcès  
avec le pic à tant <sup>indiqué</sup> et on favorise  
l'écoulement du pus par la direction de la partie  
et par la compression on soutient le force du  
malade par un régime analeptique on donne abste-  
nence de bonjour amant et bonique, s'il est accom-  
pagné d'embarras gastrique <sup>ou donne</sup> l'émétique  
<sup>ou le vomitif</sup>, si l'embarras est bilieux s'il y a caécité  
et de forable une fois l'embarras disparait on traite  
la maladie comme une affection locale s'il est  
compagné de fièvre adinami que, on emploie  
la même remède que nous avons employé pour  
le cancer erysipele.

L'Erysipele compagné d'écoulement s'appelle erysipele  
écoulateur ou érysipele écoulateur, suivant que  
l'une ou l'autre de ces deux affectes emine primitive  
et s'emporte sur l'autre.

L'erysipele écoulateur attaque ordinairement les enfans  
nouveau nés, les enfans faibles, ceux qui ont  
eu leur partie génitale dans l'accouchement sans  
qu'ils ont mal propre d'aut le sang sont sales  
par l'urine et les matières fécales et attaque aussi  
chez souvent les vieillards et surtout ceux qui  
sont faibles. et affectés d'involution de l'urine qui ha-  
mecte le scrotum, le bourse et la partie interne de  
l'urine

L'erysipele sciatique symptomatique chez certains  
individus alors l'indication est que se soigne avec la  
guérison absolue. de l'erysipele est sabordance à celle de la

maladie dont elle n'est que le symptôme  
l'erysipèle érucateur peut être causé par une contusion  
ou une forte écorchure au bras. les vains capillaires d'ymphatic  
quels la tumeur exerce par certains parties.

On reconnaît cet erysipèle aux signes suivants la  
rougeur est peu étendue et est à l'échelle d'une rose de Provins  
non encadrée de flore q. q. fois elle est vive, le malade  
éprouve une douleur qui est ordinairement causée le  
gonflement est très prononcé mais sans résistance la  
partie est facile à déprimer et la rougeur se dissipe par la  
pression. le mouvement de la partie n'est pas difficile  
à cause de l'engorgement de la partie et de la grande  
faiblesse. et l'erysipèle est ordinairement sans symptômes  
précursifs ou s'ils existent il sont peu importants.

Le pronostic de l'erysipèle érucateur est difficile à  
rapporter lorsqu'il est produit par cause externe il se  
termine ordinairement par résolution et cette terminaison  
est d'autant plus prompte que le sujet est plus fort et que  
la partie atteinte est moins importante, c'est un symptôme d'une  
maladie organique il est très fâcheux.

Le traitement de cette affection consiste à diminuer les  
symptômes inflammatoires et à rendre la force à la partie  
éruquée et faire disparaître la plus promptement la  
cause qui l'a produite, si par exemple la cause existe  
dans la malpropreté de la partie la désinfection et la  
propreté de cette partie au point de la partie avec une solu-  
tion de fleur de soufre de mielot à laquelle on ajoute  
un peu d'eau de vie.

Si c'est produit par l'écoulement d'une matière acide et irritante  
on baigne la partie par une solution de corps gras qu'on  
a soin de laisser pen longtemps écouler qu'il se renouvele  
La position de la partie est aussi très importante, on  
tient toujours la partie malade de manière en ce  
que la sérosité de son fluide se dirige vers le bas  
les grandes trocées si par exemple il est attaché la tête

Qu'elle est élevée par des oracles à son début  
C'est-à-dire la partie seulement. Pour. Contre-indication topi-  
que. qu'on veut appliquer; mais il y a que la  
Symptôme inflammatoire sont dix ans il faut  
que la Compresse d'ait arbor forte pour refouler.  
Calympe. qui ne crève que difficilement. Pour.  
cela on fait un bandage circulaire en doigt qui  
occupe toute l'étendue du membre.

C'est Erysipèle est Complicque d'embarras gastrique on  
emploie l'émétique simple ou arbor aux singuliers  
Si l'embarras existe dans le Canal intestinal après quoi  
on emploie le boiron. légèrement tonique. Et si que  
du vin étendu de eau de infusion aromatisée, la  
solution éthérée, l'atome apierm aiguisée avec de l'ac-  
cool sont la quantité d'ira les portées aux forces de  
l'individu; il arrive souvent que cette maladie  
viene à bout. C'est pourquoi. Pendant la Convalescence il  
faut résister. long temps sur le traitement. C'est à profus.  
Si cet Erysipèle idiopathique est Symptôme d'un  
Combat les Symptômes inflammatoires pas de légèr  
résolutif.

Une dernière variété de l'Erysipèle est celui que l'on appelle  
Erysipèle pustuleux. Bon. C'est une Erysipèle  
de q. q. autres. cette espèce d'Erysipèle est rare que  
cette doit avoir parlé il en diffère en ce que c'est  
constamment produit par cause interne il est ordinairement  
sporadique q. q. fois il est typique d'unique il a été très bien  
écrit dans le Journal de l'Académie de Médecine, la Clinique  
Pneumonique dans Proust.

Cet Erysipèle attaque de préférence les Dames et les  
vieilles. et est + fréquent en automne et au printemps  
que dans l'été et dans l'hiver il peut être produit  
par d'embarras gastrique, par d'embarras intesti-  
naux il peut survenir à l'époque ou cesse les flux  
menstruels, à cette occasion flux hémorrhoidal s'ouvre  
et varie.





22 / matière qu'on suppose dans l'estomac ou  
en vient ensuite la récidive par le sang d'orge, le  
de veau et de poulet avec une addition de Baume  
vin. Si le malade est faible on emploie la lixivie  
nasse vineuse ou le vin étendu d'eau on  
entreteint la lixivie du ventre par des lavemens  
à molles et laxatifs. Le traitement local du Zona conduit à peu de chose  
il est même abandonné de +ieurs. Cependant si la  
douleur et la chaleur sont considérables on peut appliquer  
Onguent ou Compresses imbibées de l'Esprit de Cologne  
ou l'on peut employer les semelles de plomb et de sonce  
qui favorisent l'écoulement du sang. Contre le sang dans le  
pustuleux, on peut aussi employer la Croute de sang en  
l'enduisant avec l'huile de safran déjà fait.  
Lorsque l'erysipèle pustuleux est dans le point de se terminer  
il faut examiner si q. q. crues ne doit pas avoir lieu  
de le fait ordinairement par le suint, par l'écoule-  
ment de l'urine, ou par le succeur, alors il faut s'en tenir  
au point de ces crues au emploi, ou les Catartiques  
ou les Diurétiques ou les Diaphorétiques q. q. fois  
et ainsi que malgré les crues il n'est pas d'écoulement  
viva persistante, qu'on aura duré une année sans  
alors on emploie principalement de véricatons  
d'écoulement ou secondement les véricatons volantes  
le moxa on peut employer les narcotiques mais  
avec beaucoup de précaution.  
Cet Erysipèle peut revenir d'une manière périodique  
alors on le prévient par le moxa que l'on a vu  
indiquer pour l'erysipèle bilieux.

## Dufurone.

Le furone agit à pile Clou, furuncular par

relativement et au siège dans l'os, mais  
non dans la même partie que l'empyème qui  
occupe comme nous l'avons dit le réseau muqueux  
antérieur que le furoncle est situé plus profondément  
et attaque le tégument cellulaire continu de la peau  
arabique de Serme il diffère encore de l'empyème  
en ce qu'il est toujours produit par cause interne

Les furoncles diffèrent relativement à leur nombre  
il ne faut pas avoir qu'un comme il peut en exister  
plusieurs ils diffèrent encore quand à leur volume  
qui est en variable ils sont ordinairement de  
volume d'une noisette ou d'une petite noix j'en ai  
vu de la grosseur du poing mais cela est rare  
et se manifeste au il y a beaucoup de tégument  
cellulaire ils sont en général volumineux qu'ils  
sont nombreux ils diffèrent encore relativement  
aux parties du Corps qu'ils attaquent, ils se  
forment en général au il y a d'avantage de  
tégument cellulaire, tégument qu'au visage, à la partie  
latérale inférieure du Cou, à la partie inférieure  
antérieure de l'abdomen, à la partie postérieure et  
latérale du Bras, aux bras, au sein, etc.  
Ordinairement et volumineux

Lequel soit une cause externe peut devenir occasion  
nelle de furoncles par individu sujet au furoncle  
et d'une Contusion cette Contusion peut se développer  
par un furoncle de la partie Contus.

Il se forme de la surface du Corps.

91. Il est difficile de dire quelle soit la Cause interne  
qui survient & donne lieu ou a Cependant Constante la  
Suivante, il vient assez souvent à la suite d'une fièvre  
répétée, d'une fièvre ancienne, à la suite de la  
fièvre violente de la Rougeole, de la Scarlatine et  
de l'Erysipèle. Pour Cause interne il survient assez  
souvent chez les individus qui sont au sein d'une  
Gastro-entérite et au voir il survient assez ordinaire-  
ment à la suite d'une lésion antérieure.

On le reconnaît au Caractère suivant. Il se  
présente sous la forme d'une éruption cutané-  
te intermittente. — à celle que l'on désigne sous le nom  
d'éruption elle est à la fois sensitive, irritative et  
éliminatoire. elle est d'autant plus grande que la lésion  
affectée contient plus de suppuration. Elle se diminue  
changeant, augmente. Soit la lésion. q. q. fois  
cependant la lésion se diminue en la changeant  
le Caractère, le malade ressent une chaleur  
vive.

Le furoncle a une marche plus — rapide elle  
est plus prompte chez les sujets jeunes et chez  
— les sujets adultes et encore — du côté de  
vieillesse, à la suite d'une fièvre et à marche  
lente.

Le furoncle se termine par suppuration ou  
par gangrène et est un Caractère d'effluve et  
cette maladie.

Lorsqu'il avance vers la Extrémité du membre  
et qu'il est en suite, d'une couleur violacée  
qui bientôt blanchit on ressent une fluctuation  
et le bord de la tumeur est encore dur.

se ou attend et se fait une ouverture irrégulière  
q. q. fois il s'en fait + c'est la portion de peau qui  
reste est mince et peu sensible lorsque la tumeur  
est ouverte il en sort du pus mêlé au sang qui  
est + ou - décomposé dans le pourcentage de l'air  
dans il s'accroît encore du pus mais - de  
sang. à cette époque il s'engage dans l'ouverture du  
tissu cellulaire qu'on appelle doublette qui  
est entièrement gangréné, c'est probablement  
cette partie qui a été primitivement affectée d'in-  
flammation, q. q. fois si l'ouverture est large le  
doublette sort de lui-même d'autre fois il a de  
la peine à sortir alors on favorise la sortie  
soit en le tirant avec légèrement avec des pinces  
ou en lui on agrandit l'ouverture.

Les écoulements qui ont lieu après l'ouverture du furon-  
cle sont d'une couleur d'une couleur quelconque, soit  
ou - long temps, plus sont sa couleur irrégulière, la  
d'effort qui en résulte est - à celui de l'érythème  
scrophuleux dont elle diffère par son siège,

Le traitement du furoncle est très simple comme

comme l'affection est produite par cause interne et fait  
rechercher cette cause, la combattre. On doit  
tenir la gorge au la petite verole, au asthme.  
La dépuration de cet malade, par le bain,  
de lavement purgatif, de saignée, de régime.  
2. l'usage du sulfureux, du bisulfure, les bains  
amers sont très avantageux au furoncle, s'il  
soit peu volumineux et en petit nombre, la durée est  
par incertain. Si la douleur est excessive, on lui  
et qu'il doit développer l'écoulement de la quantité  
de pus.

Si le furoncle est devenu à l'écoulement de pus ou de sang  
ou malique au combat par un moyen tout qu'on s'en  
sichant s'en à la surface du corps.

Le Traitement Local. Consiste à couvrir le puer  
d'emplâtre maturatif le plus que ceux d'onguent de  
la même, ou de Maribonne. On peut aussi le couvrir  
de Cataplasme maturatif, en général on le  
laisse ouvert & même il faut cependant le  
couvrir lorsque le doigt, est très vif & que le  
Coagulion, se fait alors une large ouverture  
l'infection est très douloureuse, mais au Calme  
Complet remplace bientôt et ôte la douleur. On trouve  
encore lorsque l'air ne marche trop promptement il se crée  
une étendue considérable de la peau alors l'ouverture  
ne se fait pas d'une si grande étendue que d'habitude  
Remède Cal.

## De l'anthrax Perin.

L'anthrax Perin est aussi appelé charbon, on  
le reconnaît aux Caractères suivants la Douleur qui en  
résulte est très sensible, le dur & très ballonné d'un  
rouge vif foncé - c'est le siège d'une chaleur vive et  
brûlante. De même que le fongus l'anthrax a son  
siège dans le tissu cellulaire et non dans les vaisseaux  
De même, mais il en diffère en ce qu'il a un  
grand nombre de saquets de tissu cellulaire et non  
une gangrène à la fois au lieu que dans le fongus  
il n'y en a jamais que deux d'affectés.

L'anthrax Perin affecte + souvent le bras que  
le membre ou l'autre souvent au pied forte-  
ment ou. Com. aux parties latérales du thorax  
et dans toutes les parties. De la Douleur rarement  
il attaque le membre

Les anthrax Perin diffèrent relativement à leur volume, à  
leur nombre, à leur largeur le volume varie depuis celui  
d'une noix jusqu'à celui d'un fongus venant et même  
qu'il se fait indolent + considérable chez q. q. d'adultes  
Il ne se développe au pied chez d'autres il se développe  
+ il en vient souvent survenir l'un en même temps

On dit 1<sup>o</sup> adieu au ventre lorsqu'il y en a un (27).  
C'est ordinairement + Cor. Inflammé qui s'y en a un  
+ c'est alors fait l'autheur de la maladie. On l'observe  
produit par Cause interne, on l'observe aussi  
malade de symptôme de la peau lorsque le  
malade a tout ce qu'il faut de la peau lorsque  
de malade d'un autre bien d'ailleurs. On le voit  
aussi souvent à la suite de la fièvre. Villeneuve et  
Pichard, lui souvent il est regardé comme  
Crise de la maladie. L'anthrax bien sur-  
vient ou vient à la suite d'un abcès qui se  
fait. C'est occasionné par le mauvais humeur  
de la malpropreté de la peau. C'est occasionné  
par de l'écrouilleux ou par une ou deux fois  
qu'on s'en a un. C'est occasionné par le  
que de la Cause. Occasionné en faisant le  
morbide de la fièvre, les par la Cause.  
Les Symptômes généraux qui accompagnent la  
fièvre. L'anthrax de la fièvre. C'est le chancé  
une by malade + ou interne, disposition à  
l'absorption. anorexie ou dégoût de la viande  
nausée q. q. fois. Vomissement. C'est de la fièvre  
et parfois inégales, les différents Symptômes  
de la fièvre + on l'observe souvent de la fièvre + de la  
à 6 jours.

On remarque fièvre Symptôme local. C'est de la  
douleur au nez, à la gorge + souvent que celle de la fièvre  
elle ne change pas de la fièvre. C'est de la fièvre  
de la fièvre. C'est occasionné par la fièvre  
irritant qui a donné lieu à la maladie.

72) et par l'étranglement du Tissue cellulaire ainsi  
que par la Compression exercée sur ce Tissue et les  
des filaments nerveux qui viennent s'y distribuer  
La Tumeur que présente l'anthrax, et surtout  
s'allant par l'élasticité ou observe q. q. fois au dessus  
de cette Tumeur au second Cause par l'obstruction  
des vaisseaux & lymphatiques résultant de la  
Compression exercée sur eux. Le Symptôme de la  
Cause de l'anthrax peuvent Causer q. q. fois la fièvre  
l'insomnie et même d'agitation. d. même que  
la fin de l'anthrax se termine Coûrtement par  
gangrène la gangrène Commence par affecter  
les Tissues de Tissue cellulaire Contenant des vaisseaux  
artériels. du Dorsal. après quoi elle l'emphre de la peau  
le Tissue cellulaire gangréné Couvre la Cause  
Blanche naturelle mais il descend fétide.  
L'anthrax peut avoir des suites fâcheuses par  
exemple celui qui se développe dans la base du  
Voyage, il peut détruire les Vaisseaux et les Tissues  
et descend et il forme des Cicatrices déformées du  
visage de l'Orifice qui gênent le mouvement  
du Dorsal lorsqu'il affecte le Tissue de la poitrine  
ou de l'abdomen l'inflammation peut se propa-  
ger jusque dans les Vaisseaux et affecter les  
membranes Cerebrales qui se développent. la Prognostic  
de l'anthrax dépend de l'endroit et de l'organe qu'il  
affecte et de l'organe qu'il attaque et de l'organe  
à la vie.  
L. q. autour de l'organe que dans son développement il peut  
d'abord paraître disparaître la Cause interne et plusieurs  
causes de la Tumeur. Les Catarrhes et l'altération



Ouvre la Bourse d'elle même & Crève sans  
 prolonger de Dehors up. La Durie de la maladie  
 des encoirs d'autre incertain  
 C'est des Raticiens qui usent d'un traitement + actif  
 après avoir fait disparaître la Cause interne, et  
 la Bourse est saluée et étrangée ou y pratique  
 une incision Craciale s'étendant profondément  
 jusqu'à la Base de la Bourse et au flanc.  
 jusqu'au os du dernier cecle inflammatoire, cette  
 incision est douloureuse la douleur de l'écoulement  
 pendant + une heure on emploie le Cataplasme  
 au bout de q. q. jours la douleur est calmée la rougeur  
 disparaît le lambeau de l'incision se détache facilement  
 se recouvre au adhérence et l'intérieur de l'organe  
 purgatif. On emploie aussi avec un grand avantage  
 le Bougie à l'intérieur

## De l'anthrax & Malin

L'anthrax & malin sont deux formes d'histoire  
 détaillée en parlant de la gangrène avec le nom  
 de charbon il est constamment produit par Cause  
 d'été et cette maladie comme la furoncle et l'anthrax  
 se trouve à son siège d'au le tissu cellulaire des  
 aréoles de derme il se termine constamment par  
 gangrène, le Douleur qui tue les animaux qui  
 ont été affectés, le vétérinaire qui se fréquente les  
 animaux y sont très sujets pendant la durée de la  
 développer souvent des symptômes adynamiques  
 L'anthrax malin est contagieux il régné q. q. fois

38 / et sic enigmatiquement. Quatrième Sarcé l'a  
obscurci et al' l'at' - l'éc, cette espèce de maladie  
est toujours mortelle sans traitement  
C'est-à-dire à débarrasser les vides ensuite à  
admettre l'air et l'écoulement du sang, et le sang, septi-  
-quid à l'at' d'éc.

## Du Phlegmon

Le Phlegmon est une tumeur inflammatoire due à  
l'écoulement du sang, cette tumeur est ordi-  
nairement circonscrite et se dégage, dans les résistances  
l'astigme du sang + on s'occupe qu'il se dégage par  
la déhiscence elle est le siège d'une douleur  
d'abord gravative puis d'une douleur pulsative  
à la fin elle s'écoule le caractère gravative se  
signale et joint souvent la fièvre augette ténue, si  
le sang est robuste et que l'inflammation est intense, dans  
cette circonstance cette fièvre peut être d'un mau-  
vais caractère, le Phlegmon diffère du Ulcère de  
~~l'Empyème~~ d'anthrax par sa tige et par sa  
cure, car la tige du 1<sup>er</sup> est dans l'état de cellulair  
contenant dans les aréoles de l'écoulement d'écoulement  
par leur communication la fièvre et l'anthrax se  
commencent. Par la suppuration et la  
gangrène le Phlegmon devient très rarement cette  
communication qui ne doit être regardée que comme  
un accident de cette maladie.

Le Phlegmon diffère aussi relativement au  
siège, il se développe dans toute la partie qui  
contient du sang cellulair et le + souvent dans  
la tige, car, quelle est + à l'écoulement et qui  
sont + exposés à être irrités ténus sont le creux

34.  
La lachelle, de l'air, le péricard, le voisinage  
de l'auricule, la partie interne, des membres de l'phlegmon  
des membres, peuvent se réduire à deux genres. Tantôt  
ils attaquent la tige cellulaire. Tantôt ils  
attaquent la tige cellulaire sous aponeurotique  
Le phlegmon de la tige cellulaire sous l'auricule  
se manifeste. Le traitement est principalement le même  
sont accompagnés. L'air, la suppuration abondante  
qui draine le muscle affaiblit le muscle et  
entraîne p. q. f. de la tige.

Le phlegmon peut encore arriver dans tout  
le organe qui contient la tige cellulaire en  
grande quantité, tels sont les ganglions lymphatiques.  
Ces qui en contiennent la tige sont ceux situés à  
l'arrière de la mâchoire dans la région élasto-  
dienne et l'antérieure, à la partie latérale inférieure  
du cou ceux de l'air et de l'air il est facile.  
Le développement de ceux de la cavité splachnique  
mais ceux de l'air sont toujours l'air de la tige  
interne ou en a observé au centre et au sommet  
mais très rarement. Il se développe souvent dans  
les aînes et le foie rarement dans celles d'air  
ou de la tige quelques-uns sont tout ou presque  
aucune observation n'en a été faite dans l'air  
de l'phlegmon diffèrent relativement au rapport  
de la tige affectée avec les parties voisines. Par  
fois se fait appelle sans voir un enfant nouveau  
tant en symptôme d'indigestion que dans le cou  
et le péricard, on trouve souvent d'air, au centre  
l'urine la dernière en blanc dans le cou de l'air  
parfois, il revient trois fois en deux jours, et on peut

[illegible]

Le Phlegme se voit diffuser encore relative-  
ment. Valeur volume on le voit, a peine de volu-  
me d'une viscosité, d'autre fois aussi, volume peu  
qui le forme d'un chapeau, mais cela n'est que  
pour peu d'instants, on il y a beaucoup de tuffe  
cellulaire, et on le voit lui-même, ce Phlegme  
relativement aux Caues qui le ont si souvent  
coudé de sauge, son grand  
Relativement aux nombres unid. et de scit  
attaqué d'un ou deux phlegmes qui le main-  
tiennent en un état de l'autre, et tout cela se

et y en a plusieurs à la fois. Ils ont toujours  
une marche, une durée, un siège, une étiologie, un  
différent, un état, un traitement, à leur Caractère et à leur  
Caractère. Ordinairement ils sont bénins et s'ont  
à dire, accompagnés de danger en rapport avec  
l'intensité de l'inflammation.  
Quelques fois ils sont malins alors ils sont  
Presque toujours produits par cause interne et  
Ordinairement symptomatique d'un gros mauvais  
fièvre.

Les que fois les symptômes inflammatoires sont de  
nature et malgré cela l'aggravation survient  
elle est même assez dangereuse.

Le Phlegme Cerebral en général, peut être regardé  
comme une maladie de forme le Cerveau qui  
le produit. C'est la cause commune il peut être  
Occasionné par le Cerveau lui-même, ou par  
quelque chose, par le Cerveau pathologique et par  
le Cerveau interne Constitutionnel.

Parmi ces causes il faut être regardé les qui sont d'un  
côté ou de l'autre, les Contusions, les plaies, Contusions  
les contusions, q. q. fois il reconnaît pour cause un air  
froid, il s'ont souvent causés par les substances acides  
et irritables par le contact de matières exotiques ou  
de leur Couloir naturel. Néanmoins on a vu que  
dans le tissu cellulaire il peut aussi être causé par la chaleur  
de certains liquides. Comme l'urine dans le sein  
il n'est pas rare de le voir survenir après la respiration  
de la gale ou de l'arthrite, à la suite de la rougeole  
de la Peste vérolé lorsqu'on a négligé d'éviter la

menacer à la suite d'une éruption ~~de~~ <sup>de</sup> ~~hemorroides~~ <sup>hemorroides</sup>  
habituelle. De l'épistaxis, de menstrie  
de hemorrhoides, de l'écoulement de la suppuration  
brusque d'un écoulement, d'un écoulement et un écoulement  
le sang perçurent saignée, le sang et le dillier  
l'âge de l'adulte, l'âge adulte, l'âge adulte  
comme cause de l'hémorrhoides de même que les profonds  
qui déterminent une irritation fréquente de l'écoulement  
brusque d'une vie active à un repos absolu, les  
symptômes de l'hémorrhoides d'écoulement d'écoulement  
soit superficielle ou profonde, qu'elle attaque le  
trou ou les membres.

Le l'hémorrhoides superficiel des membres se reconnaît  
aux caractères suivants; la tumeur est rouge, présente  
une saillie circonscrite à la surface de l'écoulement, elle  
est dure, légèrement compréhensible, la douleur augmente  
par la compression et le mouvement de la partie  
elle est rouge que celle de l'écoulement - que celle  
de l'écoulement la rougeur d'écoulement de la douleur  
La chaleur est douce et habituelle, lorsque la douleur  
la tumeur est dure et habituelle, lorsque la douleur  
chaleur est douce et habituelle.

Lorsqu'il commence à se développer, le malade éprouve  
doul la tumeur un sentiment de pesanteur et d'écoulement  
ensuite un abaissement croissant de celle du cou.

On le pousse en y appliquant la main, les  
pulsations sont de pulsations de développement  
doul résultent de tout écoulement, la fièvre, la douleur  
La douleur est tendue, rouge ou blanche

La saignée est intérieure et la respiration assez fautive  
— que son siège, ne soit au voisinage des foyes  
— d'ailleurs est assez rare d'un rouge foncé sans  
— Le d'ailleurs, le malade est assez souvent sujet à  
— Contractions de la fièvre est modérée la peau  
— est chaude, elle s'élève et s'élève si la fièvre est  
— intérieure. le diagnostic de ce Phlegmon est assez diffi-  
— cile et vain. Voudrait que le membre est tou-  
— épaissi et l'apophyse + ou — extensible.  
— le Phlegmon est local d'ailleurs est d'abord  
— une tumeur. Sans la saignée l'extension q. q. fois utiles  
— le gonflement du membre est général. C'est d'abord  
— par le développement de la tumeur et la légè-  
— rement Symptomatique du foye cellulaire la douleur  
— qu'il provoque le malade est d'abord gravative ensuite  
— pulsative. la chaleur + ou — intérieure? la  
— peau couverte la couleur naturelle elle est  
— q. q. fois décolorée par infiltration lympho-  
— cellulaire. le mouvement du membre est difficile la  
— douleur. peut s'étendre à tout le membre. par la compression  
— du nerf qui le traverse. attribuer à la tumeur. il peut  
— se développer une infiltration au-dessous de la tumeur  
— enflammée par la compression de lymphatique  
— Ces différents symptômes pourraient être produits  
— par une affection charmatisme que l'on fait.  
— peut confondre avec le Phlegmon. le seul affection  
— différent. entre elles c'est que le Phlegmon se  
— termine presque toujours par suppuration ou bien que  
— l'autre se termine par résolution.  
— On peut encore confondre le Phlegmon avec le Cancer

38 Cellulaire nous ne s'agit d'une tumeur tout le  
tumeur est hétérogène. Les tumeurs froides  
les Phlegmones profonds, naissent retentissent et  
à leur volume et en fait de rigoureusement circons-  
crits. D'autres occupent toute l'étendue d'une che-  
ville. Les Phlegmones profonds sont toujours  
accompagnés de fièvre.

Il est des causes de ces Phlegmones qui peuvent  
devenir signes diagnostiques. Si un Phlegmon est  
produit par Contusion et que cette Contusion ait été  
produite par un Corps large et solide et qui a agit  
sur une surface étendue. Les douleurs sont très graves  
et les tumeurs + que si le Corps a été dur volumineux  
et agit avec très peu de force. Cela voit encore  
l'arriver à la suite de la Commotion de membres  
les tumeurs très profondes avec des instruments mala-  
cés. Peuvent donner lieu à Phlegmones, ils  
peuvent encore être causés par les Corps lancés par  
la poudre à Canon dans les Corps étrangers enfon-  
cés profondément dans les membres. et par des  
flegmes de mauvais Caractère.

Le Diagnostic de Phlegmones de tumeur cellulaire  
au doigt est bien difficile celui qui adague le tisse  
cellulaire tendu au-dessous de l'apophyse plantaire  
et celui du tisse cellulaire de la Cuisse ont un pronostic  
bien + difficile à porter.

Le Diagnostic de tumeur cellulaire de virulence est très  
difficile il faut donc se hâter d'avoir recours aux  
Causes qui l'ont produit, Car Phlegmones et tumeurs.



indirectement produite par la lésion ext<sup>re</sup>  
rieure de l'organe qui est très large, comme  
le fœtus du fœtus, et peut être épuisé.  
Le phlegmon peut être produit par des haies,  
pneumonie, pour un air froid, par des maladies cutanées,  
répétées.

Les douleurs graves qui accompagnent l'empyème sont  
ce phlegmon se voit bientôt l'ulcère de l'empyème  
par la pression, la chaleur de la tumeur est sou-  
vent, la fièvre est assez intense d'après la lésion  
ou l'extension de cet organe. Et admet de l'organe  
affecté de phlegmon le diagnostic de ce phlegmon  
est très facile lorsque les symptômes inflama-  
toires ont une marche très rapide et que les symptômes  
est fort après le signe du phlegmon, nous allons  
examiner les différents modes de terminaison.  
Le phlegmon se termine assez souvent par résolution, c'est-à-dire  
qui arrive lorsque la cause a été bien active et a  
agit de manière à se faire très court et qu'on a reconnu  
et combattu de bonne heure les symptômes locaux  
et généraux.

On a dit que terminaison on a dit par la compression de la  
tumeur encore et souvent par suppuration les deux qui en  
résultent. présente des caractères assez remarquables pour  
les avoir indiqués en détail. On l'a dit à l'ulcère cellulaire,  
il est blanc épais, homogène, doux au tact, et non instant.  
lorsqu'il n'a point été en contact avec l'air, lorsque le  
phlegmon se termine par suppuration il faut que  
l'inflammation soit portée, à un certain degré  
un peu trop violente, il faut aussi que le malade soit  
assez fort et que la cause n'ait point agi ni trop  
violamment, ni trop longtemps.

387. L. q. soit ce Phlegmon se termine par gangrène  
et cela dans différentes circonstances cette  
terminaison peut survenir par suite d'inflammation  
quoique par cause étonnée et devenue très intense  
et lorsque la partie enflammée a été trop  
desorganisée, elle peut survenir lorsque la contusion  
a détruit le vaisseau et le nerf de la partie et  
desorganisé son tissu cellulaire la gangrène  
peut survenir d'inflammation étant extrême, mais  
venant d'une cause par des substances chimi-  
ques très acides et persistante par le jauche-  
ment des matières locales dans le tissu cellulaire  
la gangrène se forme dans le petit bassin  
~~et survient d'inflammation et est~~  
~~extraordinairement intense, cause par des substances~~  
~~chimiques très acides et persistante.~~  
La sérosité infiltrée dans le tissu cellulaire peut le  
rendre aussi, L. q. soit le Phlegmon survient chez  
des sujets très faibles soit naturellement soit par  
L. q. maladie et peut aussi survenir chez des individus  
qui ont été exposés à des influences étiologiques  
gangrène peut terminer le Phlegmon sans qu'on puisse  
l'attribuer à aucune cause connue.  
L. q. soit le Phlegmon se termine par induration  
et cela peut arriver très promptement et se termine  
ordinairement par induration dans le organe très  
celluleux tels que les pommelles on voit souvent  
prendre cette terminaison au Phlegmon des glandes  
inguinales, et mammaires L. q. soit il prend cette  
terminaison par l'emploi de topiques répétés  
et lorsque l'individu soit très faible soit  
qu'il prenne une autre terminaison

Le Phlegmon peut se terminer par suppuration 39.  
mais une terminaison est assez rare, on la remarque  
dans celui du tissu cellulaire qui environne le testicule  
dans celui du testicule et en général le phlegmon  
surcutané se termine par suppuration terminaison  
que les autres, ceux qui se terminent par suppuration  
soit presque toujours conduite par l'écoulement.  
Quand au diagnostic du Phlegmon on peut dire que le  
surcutané est le - dangereux.

Ceux qui sont profondes et sont d'autant plus dangereux qu'ils  
sont étendus et que l'apoplectic s'enveloppe est -  
extensible.

Les symptômes qu'on doit le reconnaître sont une douleur  
très vive qui est cause de convulsions le testicule  
et la vésicule de l'urètre.

Ces phlegmons intérieurs sont très graves et le sont d'autant  
plus que l'organe est attaqué dans une grande étendue  
on peut tout à fait se le représenter comme les deux premiers  
phlegmons phlegmon. Il survient de la fièvre le danger  
est en rapport avec celui de la fièvre elle-même.

Le traitement du phlegmon varie considérablement  
suivant les circonstances qui accompagnent le  
phlegmon lui-même.

Cette espèce d'inflammation peut être aiguë et idiopathique elle  
peut survenir sympathiquement ou peut être  
occasionnée par différents virus et est aussi des phlegmons  
qu'on pourrait ranger au nombre des inflammations graves.

Pour établir d'une manière juste le traitement du phleg-  
mon il faut se rappeler les différences qu'il peut éprouver  
et est ou surcutané ou profond attaqué le tout ou  
les membres.

Le traitement du Phlegmon sous l'état de  
membre couronné dans l'emploi de l'épingle  
émollient, ordinairement sous forme de Cataplasme  
le bain tiède émollient qu'on veut faire prendre  
à la partie on étend le Corps suivant le degré de  
l'inflammation on veut accélérer ou provoquer la  
suppuration en appliquant au membre le Corps  
gras. tige qui le dégage, mais on le emploie +  
rarement que les émoliens simples, il faut d'ailleurs que  
le sujet soit faible, au emploi au plus les fumigations  
et les fomentations émollientes mais leur usage est  
— efficace que celui du Cataplasme émollient  
le si doit être le narcotique et le répercutif  
rarement employés cependant il est du Carbonne  
Phlegmon par exemple qui serait produit par Cause  
externe et qui traite à son commencement par des  
répercutifs qui diminuent et font disparaître les  
symptômes inflammatoires on applique ordinaire-  
ment ensuite la partie un Cataplasme unguenté de  
répercutif.

Le narcotique peut être employé l'inflamma-  
tion Phlegmoneuse étant encore à son début et produite  
par Cause externe et lorsque la douleur est très  
vive, il faut avoir soin de ces deux emplois de  
que la douleur a cessé sans quoi il en résulterait  
de mauvais effet il ne faut pas non plus que l'inflam-  
mation soit à un certain degré d'intensité Car le  
narcotique pourrait en supposant à la réaction  
de la Capillaire par le sang Cause la gangrène  
de la partie  
L'emploi de l'émollient doit être continué jusqu'à  
que la suppuration soit établie.

Le traitement intérieur du Phlegmon doit  
agir avec efficacité et promptitude la saignée  
veineuse est au moyen par lequel on agit  
d'autant mieux qu'on tire davantage de sang et  
que la saignée est pratiquée plus  
de la partie malade on emploie rarement la saignée  
capillaire — que la veineuse n'est été inutile  
et que le Phlegmon soit compliqué d'erysipèle on  
ne doit point appliquer les saignées sur la partie  
enflammée le sang qu'on doit tirer varie suivant  
l'intensité de l'inflammation la force de l'individu  
ou le Conseil qu'on a chez soi de sang lorsqu'on  
voit diminuer les symptômes qu'on a intention de  
combattre par saignée.

On doit encore employer avec utilité les Boissons  
de la nature médiocrement et légèrement diuétiques  
les decoctions de bouc, de sauc, de chiendaut, de  
visquière de mauve de violettes le lait d'ânes et de  
chèvre qu'il augmente la transpiration et le sa-  
lement de l'urine.

Si le Phlegmon est très étendu et que la fièvre soit très  
intense le repos et une diète rigoureuse seront indi-  
qués si au contraire il est facile ou diminué seulement  
la quantité des aliments et on fait seulement  
le repos de la partie malade.

Il est aussi nécessaire d'entretenir la liberté du ventre  
par des lavemens emolients et en mettant du nitre  
dans les boissons que nous avons présentées.  
lorsque la maladie commence à décliner il faut diminuer  
les remèdes employés et faire rendre au malade un  
léger exercice, on peut aussi employer les résolutifs  
aux émollients si la forme ne s'abaisse au sang  
ou met les l'ouverture de la charpie sèche si l'on

2) De l'usage de l'acide ou appliqué des Cataplasmes  
depuis l'abcès jusqu'à ce qu'elle soit dissipée  
si le plegmon se crève par induration il  
faut en rechercher la Cause, q. q. fois elle est  
produite par Cause externe, d'autre fois par  
faiblesse qui peut être générale ou locale.  
Séulement la partie enflammée, on peut combattre  
- Ce Cause par les émollients & le repos  
aux Corps gras si le malade est faible ou lui pres-  
crit un régime analeptique

Le traitement du plegmon profond situé au-dessous  
de l'apophyse d'envoloppe. est le même que la  
siècle est relativement à l'emploi de moyen  
général.

Le traitement local est différent. au plegmon pro-  
fond est situé sur un os ou à son voisinage il peut  
y avoir de nombreux abcès. La partie  
située au-dessus de l'abcès est extensible telle  
sont ces tumeurs à la partie antérieure des doigts, des  
orteils, de la main, de la plante  
du pied, alors début et lors qu'il se soit produit  
par Cause externe, on peut employer avec avantage  
les répercussions & les caustiques on a essayé  
d'appliquer l'acide ou l'huile d'argenter au voi-  
sinage de la partie elle agit comme un moyen  
d'induration, qu'il faut, si le moyen n'est pas  
diminué le. l'usage d'émollients & le  
- Douleur est toujours vive et la tension considérable,  
on a conseillé l'emploi d'émollients simples,  
d'autre les émollients aromatiques Corps gras. Elle  
est qui ont conseillé de pratiquer une ouverture  
à la partie enflammée Qui 1° de la partie

enflammée, 1<sup>o</sup> vuient une grande quantité de sang. 2<sup>o</sup> facilite la décomposition du tissu cellulaire. 3<sup>o</sup> empêche que les fibres nerveuses de cette partie soient comprimées. Certains Praticiens ont conseillé l'application d'un caustique actif sur la partie enflammée il fait écouler dans les parties une humeur vive qui produit d'abord un effet d'irritation considérable, lorsque l'écoulement qui en résulte est vicié les parties profondes cessent d'être étranglées les fibres nerveuses sont détruites et la douleur cesse, l'écoulement de la suppuration devient très facile.

Il y a une autre manière d'utiliser ce premier moyen, les emollients & les Couvrants dans une inflammation d'algues - neurs peu intenses lorsqu'elles sont de se terminer, par résolution ou par une suppuration peu abondante qu'il y a peu de douleur, que la fièvre est peu intense que le malade n'éprouve ni insomnie ni convulsions. Or dans l'inflammation est + considérable, si le malade ne peut pas supporter la douleur qui est trop vive, on applique alors qu'on élimine les cataplasmes ces derniers moyens rendent l'inflammation - longue mais ils la rendent + forte sans en procurer d'autre avantage que celui de l'écoulement de la suppuration. On doit la considérer comme très utile sans faire que l'étranglement de la partie, avant d'écouler il faut d'abord voir le malade qu'on le fait avec un tour de vis ou un tour de vis de fer ou de laiton. La partie dans un bain tiède pour en faciliter l'écoulement après l'écoulement la douleur disparaît la suppuration est moins abondante que si elle n'avait point été pratiquée dans les inflammations du tissu cellulaire de la peau de la muqueuse, de la tunique de l'œil une incision est.

mon.

1111 Suffit. Est d'autre Car on il faut que cette incision  
soit cruciale.

Si le Phlegmon se développe dans l'épaisseur  
de la Cuisse et si on Car + ~~est~~ embarrasé on  
Courra le même danger que dans le cas précédent  
les emollients jusqu'à ce que l'inflammation se  
termine par suppuration, l'autre (arthroscopie)  
moyens les <sup>maturatifs</sup>, l'autre emploient les inci-  
sions, l'autre le Cataplasme. voyons maintenant, le  
quel de ces moyens est le + favorable et dans quelle  
Cas il faut les mettre en usage.

Quand l'inflammation est peu étendue les emollients  
peuvent suffire, mais si au contraire elle est forte,  
que la peau soit tendue, que les veines de la partie  
inférieure et surtout même, partie soient gonflées on  
si cette partie inférieure du membre est infiltrée au point  
il y a dans la partie un corps étranger il faut alors  
des moyens + actifs que les emollients, il faut alors  
une incision assez large pour mettre l'apôcérisme  
à découvert car on fait cette apôcérisme une  
incision cruciale dont l'étendue sera proportionnée  
l'étranglement. cette incision a pour but de  
diminuer l'étranglement et de donner issue aux  
corps étrangers qui pourraient y être contenus, la  
traite ment du Phlegmon profond diffère de  
superficielle en ce que dans les derniers les emollients  
peuvent être continués jusqu'à ce que la suppura-  
tion soit établie sans qu'on ait à craindre de l'étran-  
glement au lieu que le profond exige beaucoup +  
de soin et un étranglement serait on ne peut pas  
+ à craindre.

une autre inflammation (p. 11) dans la partie



Les Phlegmes intérieurs peuvent être traités (M)  
par les évacués qu'ils peuvent que soulager  
la maladie; ou employé aussi des Baumes, les  
saignées + ou Coignée, les Douleurs d'agau-  
tes et les lavemens emollients, ces différents moyens  
doivent être employés jusqu'à ce que cette maladie  
se soit terminée par résolution et jusqu'à ce que  
la suppuration soit établie, ensuite le traitement varie  
suivant la marche de la suppuration.

Lorsque le Phlegme est symptomatique, de pen-  
sée d'embarras gastrique ou intestinaux le  
traitement local doit être le même que dans le Cal-  
licécide; mais le Général est très différent, on emploie  
d'abord des moyens propres à évacuer les premières voies  
et l'on a soin de faire sucrer par l'application d'une  
ou +ieurs saignées. L'emploi de ceux-ci vient après  
cela on fait usage de la saignée tout d'un coup pour préve-  
nir la récurrence de l'embarras, qu'on combattra  
le Phlegme symptomatique. se terminent ordi-  
nairement par résolution & q. fois par suppuration mais  
alors elle est très abondante, il s'affaiblit le  
malade. la Convalescence de quel est très longue  
alors il est nécessaire que le malade ne soit pas soumis  
à une diète aussi rigoureuse, ou lui prescrire un traite-  
ment analeptique.

Les Phlegmes spécifiques à leur période doivent être  
combattus comme ils l'étaient précédemment par le Caustique externe  
par un traitement anti-phlogistique avec lequel on  
joint ensuite un traitement interne propre à combattre  
la Cause du Phlegme.

46 Les Phlegmes gangreneux peuvent survenir  
Soit, parce que l'inflammation est trop intense  
Ou que le suppôt est trop faible. On prévient  
Dans le 1<sup>er</sup> cas, cette gangrène par les émouleurs  
et le débilement. Dans le second il faut employer  
les Boissons.

Il faut donc la gangrène survient parce que l'infla-  
mation est trop intense et très persistante. La  
manifestation à la suite de l'épanchement de  
matières fécales ou de l'urine dans la fibre  
cellulaire des parties voisines. Les médecins dans  
ce cas ont souvent très favorablement, elle ont  
principalement l'avantage de diminuer l'étrange-  
ment, secondement de donner issue aux matières  
âcres et irritantes, qui se sont épanchées ensuite  
ou fait usage des émollients humides ou associés  
à un traitement antiseptique.

La gangrène peut survenir par cause d'éclosion ou emploi  
de Boissons excitantes et aromatiques, tels que l'eau  
de vie, Camphrée. La decoction de quinquina  
une saignée dans ce cas serait pernicieuse, si  
la maladie est intense ou avec la maladie à la suite  
qu'on craint dès que la maladie diminue d'inten-  
sité l'emploi des boissons toniques et de  
infusions amères est très bon aussi.

~~Des abscesses~~ Suite de l'inf.

Dans les abscesses. On n'emploie aussi les résor-  
bifs les émollients. On résout et q. q. fois. On  
qui est le plus confortable dans l'infusion de pivoine.

La gang. au de donner le Ragner. On dit (17)  
est extrêmement curieux, et réservé dans l'emploi  
du persulf. il peuvent avoir le + grave  
inconvenient, c'est qu'il se trouve le  
l'inf. de jeud d'une cause externe et qu'il est très  
léger si cap d'au la bulure au 1<sup>er</sup> degré. Quand  
après l'application de l'onguent acide et irritant  
par une partie il est survenu une inf. due à la  
trèsque de la l'ongue seulement. il faut en général  
est bien sur que la cause est externe et qu'il ne peut y  
avoir d'interstade pour appliquer le persulf. on a vu en  
pauvre l'inf. de gang. par l'application d'un moyen  
l'induration du testicule et l'engorgement de la prostate  
l'inf. de jeud ne sont que des moyens de la cause  
l'emploi inconvenient de persulf. dans la gonorrhée  
quand le testicule commence à s'engorger, et la  
remplace avec avantage par un cataplasme de farine  
d'au avec une certaine quantité d'alun calciné,  
ou d'au avec une infusion acide d'au de  
même de l'academie de chirurgie, de fait  
nombreux qui prouvent que le persulf. ne fait  
le gorg. malade par le persulf. se fait par  
telle sur le poutier et en cas d'arriver + avant  
qu'on ne pense) pour une douleur qui peut  
être due à un rhumatisme, et qui est due d'un  
inf. profondément située, si vous employez le persulf.  
la douleur disparaît mais elle se porte sur une  
partie interne et fait souvent comme au malade le  
+ grand danger d'au l'inf. produite par une  
cause interne, on doit toujours craindre la d'élite au  
et le met en danger, on voit souvent après l'emploi de  
topique persulf. d'au le traitement de l'emploi de  
la cause interne. On doit toujours craindre la d'élite au  
manifeste, alors et est arrivé à + pour de la maladie  
primitive de l'organe ou une maladie nouvelle.  
On emploie le l'ongue persulf. tantôt pour la frotte  
de l'ouventation, tantôt pour une de cataplasme d'au  
fois et d'au de fait tantôt liquide, tantôt mou, ou  
solide ou bien est de l'acide de l'ouvent.  
L'usage de cataplasme est résolu.

[illegible]

très promptement & fait lui donner une éponge de Chg.  
à l'égout = portant au relevé les bords de l'ongle  
de peur que le cataplasme coule & fait voir qu'on doit  
de passer le porteur d'eau. qu'on le cataplasme colle sur le  
chant au doigt et quand on veut le relever on fait souffrir  
au malade de douleurs insupportables par le tiraillement et  
l'arrachement du poêle qui tenaient l'anneau par le trou  
sûr, de la douleur et de la plaie. L'anneau ou emplâtre de cata-  
plasme qu'on a mis sur l'ongle. On doit le remplacer aussitôt  
qu'on le voit que cela est possible. Il agit bien & efface l'anneau  
mais lorsqu'on perd le raisonnement quelquefois on est forcé de  
le remplacer aussitôt. Voici comment on doit le faire. On se tient  
le poêle avec une main et on le colle sur le doigt avec l'ongle  
de la main ordinaire. Juste avant la recouvre d'une gaze  
légère dont les bords soient bien écartés. De cette manière  
c'est comme si on l'appliquait à une plaie. Cette manière  
d'en faire par et la détache par aux bords comme il  
est fait à l'ordinaire.

On doit renouveler le cataplasme chaque 12 heures quand  
il y a douleur et chaleur sous le poêle. Il faut le remplacer  
par par. Quand il s'agit de l'ongle et de le débarrasser  
promptement & il faut le renouveler souvent ainsi  
avec du miel ou avec le lait et de la graine de lin dont  
on le renouvelle 3 fois par jour pendant la chaleur.  
L'inflammation de l'ongle du doigt qui suit que la  
symptôme changeant. Quand l'ongle paraît disposé à dispa-  
raître par détachement ou emplot le miel ou l'huile  
rappelant l'ongle. De peur qu'il ne se porte entièrement  
toute l'ongle. Et qu'il ne forme une petite tumeur  
appliquée un vase cataplasme de la même manière  
soit rare si l'ongle paraît de voir de la tumeur par l'appara-  
tion ou emplot le miel ou l'huile. Si la résolution paraît  
possible on met en usage la résolution et met le  
fondant, mais on doit observer dans ces changements  
une gradation toute et nécessaire, il ne faut pas  
d'une manière brusque de l'émolument aux résolutions  
mais il faut le mener le plus à l'aise. puis l'emplâtre de  
au doigt, puis l'emplâtre de l'ongle. puis le fondant par ex.  
au met. la farine de graine de lin avec celle de  
leser de marais ensuite avec la Cassia ou avec  
y ajoute du safran pour rendre le cataplasme résolutif.

50/ (~~Le cataplasme~~) on applique ensuite les résolutifs et les poudres seules, quand on juge que la Suppuration se forme, que la Suppuration ne peut plus avoir lieu, on continue l'usage du cataplasme jusqu'à la parfaite maturité. pour accélérer la formation de l'abcès on emploie même les cataplasmes attractifs, tels sont ceux qu'on fait avec de la graine de lin cuite dans de la bière avec du saindoux des oignons ordinaires cuits sous la cendre mais mieux encore des oignons de lys pour rendre ces cataplasmes plus maturatifs on y ajoute même du vinaigre laurier.

quand l'inflammation menace de se terminer par gangrène, on applique des fomentations de plantes aromatiques cuites dans le vin ou la bière. égaré d'écaïctiaux alcoolisés de camphre ou de stériliser autre fois d'album greceux excréments de chiens de boue de vache. Ces remèdes obsoletaux sans vertu sont aujourd'hui bannis de la chirurgie. nous avons dit que l'inflammation se terminait par déhiscence, suppuration, résolution indurée ou gangrène. Quand elle se termine par déhiscence tous les symptômes de l'inflammation disparaissent le connoître se remet dans son état.

primitif quand elle étoit due à une cause  
 externe mais quand elle dépend d'une cause interne  
 il faut pour le traitement avoir égard à son  
 siège favoriser la dé-litescence de l'intérieur  
 vers l'extérieur, en pecher de tout son pouvoir  
 elle qui pourroit se faire de l'extérieur vers  
 l'intérieur dans le catarrhe de la vessie p. ex.  
 on tâche de rappeler au dehors l'inflammation  
 qui est fixée sur cet organe en la détermi-  
 nant sur un point de l'organe cutané.  
 Quand elle se termine par résolution tout  
 est fini les fonctions se réta-blissent dans leur  
~~intégrité~~ <sup>intégrité</sup> ~~capacité~~, tout revient à l'état de parfaite  
 santé à moins que l'inflammation n'ait produit  
 des adhérences, vicieuses et contre nature, entre les parties  
 enflammées mais cet accident sera le sujet d'une  
 étude particulière et doit être considéré à part.  
 Lors que l'inflammation se termine par suppu-  
 ration il en résulte une nouvelle maladie qui  
 a pris le nom d'abcès.

## De l'abcès

C'est un abcès, abscessus de abscedere s'éloigner s'écarter  
 sans doute parce que les parties qui forment le foyer s'écartent  
 les unes des autres pour faire place au pus qui forme le  
 foyer et est cause d'abcès pour cette raison qu'hypocrate  
 sertait du mot  $\alpha\pi\sigma\tau\omicron\varsigma\iota\varsigma$  qui indique l'action de s'éloigner  
 $\alpha\pi\sigma\tau\omicron\varsigma\iota\varsigma$  distance, éloignement et la maladie qui  
 $\alpha\pi\sigma\tau\omicron\varsigma\iota\varsigma$  C'est par là qu'on a dit l'abcès qui est une  
 mot à servir de place de son organe en pressant tout  
 le servant hypocrate.  
 2. d'Etat actuel en l'abcès.

32 / Paul D'égine. D'après aussi (de medica) absterge  
est corruptio ac transmutatio Carnium aut Carnosarum  
partium. Velut musculorum, venarum, arteriarum  
abscessuum. Generationem, plerumque inflammationem  
facit.

D'après ce même M<sup>r</sup>. Henteloup (Dict. D<sup>r</sup> de Sicae)  
méd. définit l'abcès une humeur épanchée nature morte  
dans une matière de pus, épanchée et étouffée  
mêlée avec du sérum de parties solides que la nature  
cherche à expulser au dehors et qui lorsqu'elle est  
laiteuse, ou + ou - promptement est en état d'inflammation.

+ On appelle abcès une collection de pus dans une partie  
quelconque du corps. Tout le siège est dans la tige cellulaire.  
g. q. d. elle produit une humeur manifeste d'abcès pur  
et il y a par élévation de la partie, une augmentation  
de volume et une factio générale et il y a collection  
qui pour la suppuration se termine en pus, ou qui  
la rend purulente. On voit que, et pour toute collection  
de pus qui peut avoir lieu dans une cavité quelconque  
du corps, qu'on nomme alors abcès, et que tout  
épanchement purulent dans la cavité d'un abcès, est  
un épanchement purulent. Par la même raison on  
entend la dureté, et la piqûre, l'hypophyse  
ou abcès de la tige, l'empyème sur le péricrâne, la  
vomique dans le péricrâne  
Les auteurs ont. L'empyème, l'abcès, la distinction  
et les divisions de l'abcès, mais on ne doit pas  
s'arrêter à des distinctions de scolastiques et  
purement imaginaires qu'on ne retrouve pas dans  
la nature, mais dans la connaissance que  
l'abcès, parce qu'il est de caractère bien  
distinct des épanchements purulents, et de caractère  
et que par conséquent, qu'il est bien distinct  
facilement l'abcès.

1<sup>o</sup> Les abcès qu'on peut nommer Phlegmones  
(PNEUMONIA) qui sont les plus généraux, sont les abcès  
dans les épanchements, qui sont les abcès dans les  
quelques-uns des épanchements de la tige, et dans les  
comme ils sont tous les abcès de la tige, et dans les  
rougeurs de la tige, + ou - adhésive, ou. les abcès  
abcès chauds.

2<sup>o</sup> Les abcès froids ou lymphatiques on les appelle  
sténés, p. a. q. de la formation d'un abcès, il se voit manifeste  
dans les abcès d'augmentation de la chaleur, et dans les  
dans les abcès de la tige, et dans les abcès de la tige, et dans les  
la manifestation qu'on voit sur la tige de la maladie, alors  
l'imp. vient à qu'il se chauffe, et l'inflammation alors  
de la tige.



+ = e. N. heart top. Peten  
containe dans un abeu  
par u. c. g. n. m. a. p. a. l. u. g. u.  
~~Leu~~ ~~sin~~ ~~le~~ ~~si~~ ~~fi~~ ~~ni~~ ~~t~~  
- ~~varie~~ change rassemble au far  
Vogel appelle d'abeu. colle  
Solo matera. in su aut in  
conversio.

Sauage appelle abeu  
clap parai le protuberance  
Defuit Cystis parakent (H)  
pet regards a potheine come  
on troue dans le nosologiste  
d'autre.

Les auteurs 3<sup>es</sup> les avoir par coagulation, ce n'est pas quel on suppose  
que certains abcs puissent se former. Sans embargo  
il y a coagulation partout où il y a abcs, mais dans  
un supposant ceux où quel on adonne le nom de coagulation  
que d'ailleurs fait dans un point autre que celui qui a été le siège  
de l'abcès, tels primitifs de simp. malacis et les arrivent à la suite  
d'une affection locale dans une partie ou  
le testicule - éloigné ou d'une affection générale dans  
le testicule. Le caractère verticillaire le pus pur et blanc la  
douloureuse du testicule cellulaire et vient former un abcs  
et suppurent. Mais on peut rapporter à ces 3. Division  
tous les espèces d'abcs possibles  
On distingue encore les abcs chauds par les  
circonstances, qui ont précédé, tels en idiosyncrasie  
symptomatique et Critique  
Les abcs idiosyncrasiques sont ceux dont la cause  
primitive qui a été vaincue n'existe dans le  
partie, quand un abcès est apparu dans le testicule  
sans manifeste il survient un phlegme qui n'est  
précédé d'aucun dérangement dans l'économie et  
aboutit simplement sans occasionner de trouble  
Les abcs chauds idiosyncrasiques peuvent succéder  
à un phlegme simple ou à un erysipèle phlegma-  
tique ou à une éruption de siège dans le testicule  
soit cutané souvent où il abcs et reçoit beaucoup de  
voies et de nerfs se joignent aux doigts, aux plexus  
supérieurs et inférieurs (ils peuvent être placés sur la  
surface ou autour du testicule, dans l'ovaire il  
ont souvent leur siège dans les organes de la cavité  
splénique tels que le foie, le plexus et.  
Ces abcs sont régulièrement circonscrits d'autre part  
diffus le 1<sup>er</sup> succède constamment à un phleg-  
me simple le 2<sup>es</sup> succède à un erysipèle phleg-  
matique, dans le 3<sup>es</sup> il n'existe ord. qu'un seul foyer dans  
le testicule il y en a q. q. fois deux séparés l'un  
autre ou réunis par un clavier  
Les signes des abcs chauds idiosyncrasiques se tirent des circonstan-  
ces antécédentes, de l'état actuel de la partie malade et de  
symptômes antérieurs généraux 1<sup>er</sup> les circonstances antécé-  
dentes peuvent faire soupçonner qu'il y a un abcs,  
par ex. quand il a existé une inf. phlegmoneuse  
aiguë et qui a eu une longue durée a été accompagnée  
de douleur pulsative continue, de fièvre, que la  
fièvre a été intermittente et de longue durée lorsque l'inf.  
parvenue à son état adouci s'est élevée à un point  
irrégulier avec diminution de la fièvre, de la chaleur,  
de la douleur, et de la gêne dans le point malade,  
la partie qui se voit tout à fait absente que par la  
présence d'un corps étranger qui paraît l'ordre, ce  
symptôme accompagné de sécrétion suppu-  
2<sup>es</sup> de l'état actuel de la partie.

24)

Quand le dur est formé, (nous supposons un abcès  
superficiel succédant à un phlegmon) la  
tumeur qui paraît rouge, résistante, douloureuse,  
et chaude, passe à un rouge - vif et comme  
viveux la chaleur diminue la tumeur est  
- dure - résistante, la molese s'établit.  
d'abord au centre de la base de la tumeur.  
étant encore dure, un peu tard ou lent.  
la fluctuation qui résulte du déplacement  
de la couleur de la liqueur, dont la base  
est perforée q. q. f. le nombre est légèrement  
infiltré et s'empate cela dépend de la  
compression des lymphatiques et de la venue  
superficielle de vases rouges.

Il en est à peu près de même pour les  
abcès qui succèdent à un érysipèle phlegmo-  
neux que pour ceux qui surviennent à la  
suite d'un phlegmon. cependant comme dans  
l'érysipèle phleg. la tumeur n'est point écar-  
tement circonscrite la tumeur résistante ne  
doit pas l'être davantage, la suppuration  
n'est pas considérable. Il en est de même  
pour l'abcès mince la peau devient d'un  
rouge obscur. la tumeur se résout et est  
remplacée par un empyème qui conserve  
+ ou - l'impression de doigt la résistance

est + au - considerable fluctuation  
n'est pas encore sensible mais la  
peau s'amincit au centre du foyer et  
permet de s'assurer qu'il existe du sang, le  
douloureux pulsation devient graduellement  
peu d'ulcère et le sang s'écoule si on  
a ouvert le foyer. et suivant que l'ouverture  
sera située à la base ou au sommet etc  
dispersera ou non d'une autre ouverture  
les vaisseaux lymphatiques sont les mêmes que  
pour le phlegmon  
abste Profonde et des cavités splanchniques  
Il faut en tout avoir recouru aux circonstances  
intérieures de la maladie.  
q. q. il y a d'ailleurs + au - considerable et saint en  
fluctuation ou au moins qu'on la reconnaît  
d'après qu'il y a pulsation et on croit  
aux obstacles de l'artère, ce qui pourrait  
faire croire à un anévrysme, il faut avoir  
égard à la cause et à la durée, à l'intensité de la  
maladie, aux changements qui surviennent  
dans l'épaisseur du membre, à l'état de la  
circulation, à la diminution de la douleur, de  
la fièvre, aux frissons irréguliers qui se font  
sentir le long du volume du membre

96) S'étend à une portion seule de la circonférence  
à la totalité dans le 1<sup>er</sup> cas en pressant la tumeur  
on ressent une espèce de vuide qui annonce la  
présence d'un liquide et si la partie inférieure du  
membre est infiltrée on peut être certain qu'une  
collection de pus existe dans la profondeur de  
l'abcès, la tumeur est mal circonscrite, le batte-  
ment diffère de ceux d'un anévrysme qui sont des mouvements  
de dilatation, de développement et se font sentir dans  
toute l'étendue de la tumeur au lieu que les battements  
de l'abcès sont des mouvements de soulèvement on  
ne doit les distinguer à la partie la plus élevée du  
membre, mais il faut attendre que la collection s'étende  
tout au tour d'une artère d'un gros calibre, alors la  
pulsation sera semblable à celle de l'anévrysme, mais  
ces tumeurs anévrysmales ne sont point précédées  
d'inf. et elles se forment lentem<sup>t</sup> au lieu que les  
abcès dont nous parlons sont précédés d'une inf.  
aiguë et rapide.

Cependant malgré ces signes distinctifs des mé-  
decins habiles. Si sont trompés et ont compris  
de ne pas en être le c. q. dans ce cas d'urgence  
il faut prendre ces précautions, faire comprimer  
l'artère principale et se munir d'un appareil  
convenable pour opérer la ligature en cas d'écoulement  
+ on s'empresse de le voir l'existence

Les abcès charnus idiopathiques peuvent se former sous des aponeuroses et se faire jour à l'extérieur par q. q'ulcère ou q. qu'ouverture de cette aponeurose mais il serait dangereux d'attendre une pareille issue du suc.  
(Maggiolini) Ils sont Symptomatiques quand on ne peut les regarder que comme un signe d'une autre maladie quand ils ne sont pas eux même une maladie essentielle ainsi quand après une fièvre il se forme spontanément un abcès qui ne termine pas la maladie quand la fièvre continue son cours, on doit le regarder comme un abcès Symptomatique, mais s'il termine la maladie on l'appelle critique on voit que cette distinction est un peu subtile et qu'on pourrait bien regarder ces deux espèces comme identiques.

(Suivant Maggiolini) Les abcès Symptomatiques peuvent se réduire à deux genres ceux qui se forment par une inf. qui se développe loin du lieu où se montre l'abcès et ceux qui surviennent dans le lieu même de l'inf. mais lorsque cette inf. n'est que le symptôme d'une autre maladie générale, le 1<sup>er</sup> cas renferme les abcès par congestion qui se développent l'exp. à l'aide de la suite de Carie des vertèbres, au jarret, par une affection

Il se ras du Bassin au coude par une carie  
de l'extrémité Supérieure de l'humérus, &c. On  
voit dans certaines fièvres putrides, ou autres  
affections générales de l'inf. se former et suppurar  
Exabcès ne sont que symptomatique

Les abcès Sympatiquer sont ceux qui sur-  
viennent à la suite d'un abcès phtegmon Sympa-  
tique eux mêmes se succédant d'un rapport qu'on  
ne peut expliquer entre certains parties. On  
voit par ex. des abcès se former au voisinage de  
l'aine d'un hémorridique la 1<sup>re</sup> période  
d'une phthisie pulmonaire.

On reconnoît les abcès critiques à l'ex-  
pèce de réaction générale qui survient ils sont  
annoncés par la diminution de l'intensité de la  
maladie primitive.

Les abcès diffèrent relativement au liquide qu'ils  
renferment.

Outre le pus de bonne nature il s'en trouve d'autres.  
On trouve mêlé à différents liquides véritables  
échappés de leur coagulum on voit qu'on voit chez des  
femmes du lait mêlé au pus dans des abcès à l'anus  
dans ceux du foie de la vésicule mêlé au pus  
à la suite d'un abcès de la vésicule du rein du uretère ou  
de la vessie d'urine &c. &c. mêlé au pus d'un abcès  
du testicule &c. ce sont des abcès mélangés spéciaux.  
par - & ceux qui ne sont que purulents

99.  
qu'il faille le sang et mêlé avec du lait  
qui soit liffé et d'une inf. trop violente tout  
leur vaisseau ayant été rompu et alors  
le danger n'est pas grand, soit qu'à la  
suite d'une violence Contusion, d'une fracture  
d'une opération d'anévrysme ou d'un grand  
buv. de vaisseaux au des vaisseaux considérables  
ayant été ébranlés et alors il n'est pas rare  
de voir la supp. prendre un caractère gangreneux  
et la gangr. faire des progrès si rapides qu'elle  
ne sert pas même d'amputation.

Dans d'autres abcès au contraire les ligaments  
et quelques v. gélatineux se trouvent sauvegardés  
même coexistences que la gélatine dans  
d'autres le pus se trouve mêlé avec des  
mucosités ou de la sérosité comme on le voit  
pour le 1.<sup>er</sup> cas dans l'abcès du sinus  
maxillaire pour le 2.<sup>o</sup> dans ceux des  
membres et de la

Dans d'autres c'est du pus mêlé de synovie, dans  
les abcès de l'articulation surtout de l'épaule et  
telle qu'on le voit le genou &c. ces abcès sont  
graves.

Ils diffèrent encore suivant leur enveloppe  
leur siège et leur volume. Lorsqu'un abcès  
commence le pus est infecté d'une stérilité



60 / tissu cellulaire

Lorsque le fœtus est rassemble en foyer et a été de  
bord en contact, qu'avec de la saumure de tissu cellulaire  
le fœtus de foyer sont celluleuses, au-dessus  
de cette enveloppe + au - attérée on trouve  
une couche de tissu cellulaire saumure et par-dessus  
se trouve la peau mais lorsqu'il fait des progrès le  
tissu cellulaire disparaît et ne reste + que les ligaments  
pour recouvrir l'abci qui se trouve aplatie la peau  
seul être + ou - amincie.

Il en est de même pour ceux qui se trouvent situés  
profondément pour des apouévrose d'enveloppes  
deux ceux qui ont leur siège entre des membranes  
et du os comme ceux du médiastin antérieur  
derrière le sternum.

Les fœtus du fœtus finis peut se être formés par  
un fœtus totalement la membrane fibreuse de  
dos et l'os lui même en avant la fœtus enflam-  
mée se paississent et forment obstacle à l'épanche-  
ment du pus; Elle peuvent se former dans l'in-  
térieur de la membrane, c'est d'un abci de  
cette nature qui est mort le fœtus de B. A. Petit  
qui sont ordinairement très volumineux et avant  
qu'ils forment soûlés au-dessus il faut que les  
membranes soient déplacées ou ne les recou-  
vrait que lors que la saumure. De bord de la ad.

que de ma tén  
doit par être appelle  
th.

bien une inf. sap.  
in par collecta

or in inf. lamento  
cueru substantia

portuam et lu  
ex hoste, et lu  
parlent / or  
Siqui puer ab ea  
laetot suu, laetot

qu'on sent la fluctuation entre les côtes (61)  
Il peut se former de l'abcès dans le péricarde  
organes vasculaires tels que le péricarde  
ventriculaire, les poumons, leur première enveloppe.  
est d'origine cellulaire peu distincte du péricar-  
dium de viscére. Le péricardium est l'épan-  
chement de l'état ordinaire et forme le siège de  
l'abcès. L'abcès est l'abcès environné d'une  
tunique épaisse sont par conséquent très diffi-  
ciles à reconnaître dans le péricarde et il en est de  
même lorsqu'ils se développent au thorax  
sans l'organe une infinité de circonstances  
peuvent le faire reconnaître et il se forme une  
adhésion avec la membrane séreuse.  
De l'abcès peuvent enfin se former dans le  
péricarde des os surtout dans le péricarde médullaire q.  
q. fois ils se développent sans que l'on s'en aperçoive  
altération à la surface extérieure, d'autres fois ils  
sont gonflés et ramolis et l'instant même on l'abcès  
se forme.

Les abcès dans les articulations et leurs  
voisins ont la même enveloppe que ceux des  
membres séreux d'abord la tunique cellulaire,  
ensuite la membrane synoviale épaissie par  
l'abcès.



69  
c'est ce qui arrive dans les abcès volumineux  
de Doumour, les Syncope sont à craindre dans  
les jeunes sujets et les individus faibles, q. q. fois  
un abcès est dans la partie superficielle de viscé-  
re enflammée, alors il contracte adhérence  
avec le davier de ces cavités ou avec d'autres  
organes voisins, quand c'est avec les parois de  
cavités de l'est + faciles à reconnaître dans l'  
abcès superficiel de Doumour p. exp. il y a d'abord  
adhérence avec la plèvre costale et avec le  
tissu cellulaire de cette membrane en suite avec  
le muscle intercostal La partie superficielle du  
g. Dorsal. inf. en grande partie souvent participe à cette  
inf. alors on voit la partie antérieure et latérale  
de la poitrine une tumeur à base large, dure  
résistante le côté droit + écarté que celui  
du côté opposé le malade se couche sur le côté affecté  
ou sur son flanc, la douleur, la fièvre diminuent un  
peu pour servirient. le tumeur se ramollit, s'agit-  
te. au bout de q. q. jours on sent la fluctua-  
tion La tumeur s'empâte un peu plus  
s'amincissent et si on lui fait une ouverture  
ils s'écoulent deux mémoires on observe de  
phénomènes avec p. analogue dans les abcès  
qui surviennent à la surface couverte du foie ou  
à l'endos. Bravant lorsqu'il y a adhérence avec

64) Le Sarcis de la Cavité abdominale, mais  
ce abcès <sup>et adhérent</sup> superficiels ~~et adhérent~~ se trouvent  
aux parois qui leurs correspondent ils peuvent barri-  
rer dans les cavités splanchniques, alors le pus peut  
s'étendre dans toute la Cavité mais ordi-  
n. il se porte vers le bas et s'écoule et vient  
former une tumeur symptomatique et  
abcès pouvant être mortel ou être rétro-  
cessif. Chronique. De viscère, qq fois ce  
abcès contractent des adhérences avec le  
organe voisin comme le foie avec  
l'estomac avec le Colon transverse  
elle peuvent dans longueur ou être mortelle-  
ment mortelle.

Le Diagnostic est très variable pour le  
abcès charbon. en général il est douloureux. D'autant  
plus que + superficiel et + volumi-  
neux que la partie affectée soit - impor-  
tante et le la maladie rigoureuse pen-  
sant avec ou apporter des Complications facheu-  
ses ou a vu dans certaines circonstances  
La Sarcite s'empare de l'organe tout en  
abcès ouvert.

On doit chercher à déterminer l'absorption  
du pus contenu dans l'abcès lorsque  
est. Résumé possible et quelle peut avoir

Lié sans danger surtout lorsqu'une  
avertir Cause est de le difformité,  
Les abcès charnés superficiels régulièrement  
Circoscrites n'ayant pas eu l'organe une étendue  
trop considérable forment de très petites  
et considérables. Comme une maladie  
légère, ceux ayant lieu dans le nez ou à la  
face sont réputés fâcheux parce  
qu'ils sont recouverts tard et qu'ils ont par  
tout. air de danger. ceux au sein, ceux qui  
se forment dans l'intérieur du crâne, sont réputés  
mortels, ceux formés dans l'intérieur du péricrâne  
très fâcheux en sont cependant. fâcheux lorsqu'ils  
s'ouvrent à la part. inférieure qui donne  
issue au pus, les abcès qui se forment dans le  
foie, sont réputés fâcheux ceux qui se forment  
à la partie inférieure d'un organe sont très fâcheux  
parce qu'ils y trouent. Dans l'abdomen, au  
col utérin, au rectum, ceux qui se forment dans  
les membranes de la cavité ou synoviales sont  
fâcheux parce qu'ils peuvent se ouvrir et alourdir  
le pus. Les abcès dans les Cavités sphériques  
ou articulaires, lorsque la Guérison est tentée  
et ne peut être et fâcheux.

Il est déterminé d'une manière exacte et précise  
il ne faut pas oublier les phlegmes même qui sont

Lein. pour la formation du pus, la 1<sup>re</sup> indication  
à remplir est d'accélérer la formation du pus.  
et d'empêcher le pus d'être seul foyer, ou  
remplit cette indication en appliquant des  
Cataplasmes emollients, ou apaisés l'inflam-  
mation si la nature est lente, lorsque la supp-  
uration est formée il faut examiner si l'abcès  
de l'avantage, ou ouvrir l'abcès, ou attendre  
que le pus soit exact<sup>ment</sup> réuni en un seul foyer.  
il qu'il offre une fluctuation dans toute son  
étendue, Il faut ouvrir le bon membre  
l'abcès qui se forme dans la gaine  
qui loge le fœtus, ou, tout d'un  
coup, qui se forment aux voisinages  
du rectum, afin qu'il ne soit pas réuni à  
ceux qui se forment aux voisinages du col,  
de la vésicule et de la prostate, ou sur la  
membrane, ceux qui sont près de  
l'articulation, ceux qui se forment à la surface externe  
des fœtus, tout ceux qui sont accompa-  
gnés de symptômes d'étranglement interne.  
Il faut ouvrir encore de meilleure heure  
ceux qui sont du pus mêlé avec du sang  
ou avec, irritant, Comme l'abcès  
urinaire. On excepte l'abcès lacteux



67  
Pour reconnaître un abcès il faut pousser  
doigt. Sur l'indice élevée de la tumeur, et avec  
deux autres pénétrer la tumeur. alors  
le doigt de l'index se frotte. Rien ne frapper  
le doigt. et de la tumeur  
fluctuation. ou tumeur abscessée.  
Il est raisonnable d'abandonner ceux même  
le petit abcès chaud. Surtout q. q. patients  
surtout ceux qui le font. Dans la partie  
essentielle, cette méthode est mauvaise. Il faut  
tout le savoir pour éviter la difformité, et  
faire pratiquer. Surtout une piqure avec une  
lancette, en général il faut ouvrir tout  
le abcès chaud, ou ouvrir le abcès  
chaud avec un instrument tranchant  
piquant, avec le Caustère actuel et  
potentiel, on préfère à tout ce moyen  
et instrument le bistouri. parce qu'il pénétre  
plus profondément et que l'ouverture est  
toujours suffisante pour l'évacuation du  
pus, le Caustère actuel est tout visible  
qu'il est. De même que le Caust. pot.  
On ouvre la tumeur à la partie la plus basse  
au lieu de la partie supérieure.

La direction doit être parallèle à  
l'axe de la tumeur, dans le cas de tumeur

8)  
au visage. La direction doit être dirigée en  
telle manière que le pince de l'acier et le vice  
lorsque les dents ont tenu. Siège d'au-dessus  
de la fosse. Il arrive qu'il y a des dents  
aut sans d'au. Intérieur de la bouche  
équale la surface externe de la fosse, d'au  
C'est car il faut les ouvrir par la gauche  
parce qu'il y a de la force et plus  
propre, ceux qui se forment. Pour  
l'os maxillaire doit être, parallèlement à la  
base de l'os maxillaire, ceux du côté gauche  
aux fibres de muscle. Menus à la position  
On les ouvre entre les espaces intérieurs aux  
d'au. L'angle au-dessus d'au d'au  
ligne qui s'étendait entre les grands pectoraux  
et grand dorsal.  
C'est l'abdomen ou les dents, de haut en bas.  
Le muscle qui couvre les dents sans  
pince, on a à joindre regard aux muscles  
lorsqu'ils sont importants il faut les ouvrir  
parallèlement aux fibres. et comme le  
fil tendant au-dessus et faut faire  
en l'ouvrant + grand, on fait l'ouverture  
à l'intérieur et à l'extérieur. pour les dents de la

68  
vie). On tient l'instrument entre la pulpe du pouce et  
de l'index. le médius vient s'appuyer sur le doigt du  
bistouri; le bout du manche entre tel l'index du doigt  
Quant on le tient comme une plume à écrire, on le tient  
ainsi pour ouvrir les abcès lacrimaux.

Autre fois on portait le doigt dans l'ouverture du foyer  
où on le promenait afin de déchirer les brides; cette  
méthode est très dangereuse, elle est dangereuse, en ce que  
les brides ne sont que des filets nerveux et des vaisseaux  
qui doivent servir au recouvrement de la peau;

On donnera une position telle que le pus puisse s'écou-  
ler, ou pressera la tumeur pour faire sortir le pus,  
ou recevra soit dans un vase, soit sur un drap.

Plongé en 4 lieux doubles. on mettra une mèche de  
Charpie enduite de Cerat pour empêcher les bords  
de se réunir et servir de conduit au pus. q. q.

praticien ne veut pas cela et veut qu'on y aise  
un plat, ou fait le pansement avec un plumasseau  
enduit de digestif ou couvre la partie de fataplas-  
emoll. Si existe encore gonflement on applique et  
Comprime. qu'on soutient avec un bandage médiocre-  
ment serré on donne à la dite partie une posit. de lat.  
Si l'abscessat est abouti. on lève l'app. au bout de 24  
heures, si elle ne l'est pas au bout de 48, lorsqu'un

abcès en Comp. Cicatrice et que l'inf. ait de faux  
Interne. Il faut faire prendre du bismou. Derivation  
et un ou deux purgatif très doux surtout si  
Elle est de Cause externe. q. q. f. il arrive que l'ouverture  
de l'abcès charné reste fistuleuse, q. q. f. il arrive  
que des bourgeois charnés naissent de la face de  
l'abcès, on observe ces phénomènes chez les lym-  
phatiques chez des Sujets chez les quels on a trop  
employé les émoussés, ou les réprimés ou les écoups  
d'eau avec l'alun Calciné, Cette dernière fourrit une  
poudre. Croute qui produit de l'irritation, on se  
sert + tôt de la pierre Infernale, q. q. f. elle reste  
fistuleuse. parce que l'ouverture a été pratiquée  
trop près de l'ouverture de l'abcès, lorsque ces  
moyens sont inutiles. Il faut pratiquer une contre-  
ouverture, elle se fait à l'aide d'une sonde cannelée  
ou l'introduit dans l'abcès en la faisant glisser  
le long de la paroi sup. de la tumeur. lorsque elle est  
parvenue au lieu le + élevé on fait saillir  
son extrémité ~~en~~ et on incise la tumeur  
sur le bout de la sonde cannelée. Il faut faire la  
contreouverture avec le bistouri et en + soin de  
q. q. f. elle reste fistuleuse. p. ce q. le  
tissu cellulaire a été détruit en trop grande quantité

superf.

parce qu'il est survenu une fièvre qui a fait diminuer  
l'embonpoint.

### abcès froids.

Ils succèdent à une inflam. chronique. on voit  
aussi qqf des abcès froids qui ont été entraînés  
par des fièvres malignes. Ils ont leur siège dans  
presque toutes les parties du corps. celles où ils  
se forment sont dans les ganglions lymphatiques  
le tissu cell. souscut. intermusc. les gland. Conglo-  
mérées sont occasionnées par le vice scrophuleux  
la vice scorig. Syphilitiq. Ils sont assez souvent  
régalière. circonscrits d'autres ils fusent au loin  
Ces derniers guérissent avec facilité, le dernier qui fusent  
au loin. et qui sont très longs à se former affaiblissent  
le malade et donnent une fièvre pétéque à la  
quelle le malade succombe, en gen. ils sont +  
volum. que les abcès chauds et continuent par  
conséq. + de plus. le phénomène qui ont lieu dans  
un abcès qui se forme dans un ganglion lymphatig.  
dans l'origine de la maladie une légère sensibilité  
se développe le ganglion reste encre roulant.  
la peau conserve sa couleur. La douleur  
épandue, le malade n'éprouve pas de fièvre, un  
peu + tard. le gangl. est + gros et beaucoup - mo.

Il glisse - la douleur est vive, elle est gravative, il n'y  
a pas encore de fièvre, dans la 3<sup>e</sup> période la  
peau devient rouge. terne le ganglion est encore  
+ volumineux ou sent autour de lui le tissu cell.  
engorgé. après tout les gangl.<sup>ous</sup> voisins s'engorgent  
par. Continuité d'augmentation ce engorg. ne se  
terminent pas ord<sup>r</sup> par suppuration, à mesure que  
la peau rougit, elle s'amincit, la douleur est pass.  
tôt alors le malade éprouve la fièvre la tumeur  
s'ammolli de son Centre vers la Circouf. elle offre  
fluctuation à son Centre tandis qu'à sa base  
il y a des. Callosités cela est un signe Certain  
son tissu est désorganisé, la tumeur gagne en  
largeur et en profondeur et enfin elle se rompt.  
à la suite de cette ouverture. le pus sort. il est  
- Consistant que celui d'un abcès chaud après  
Cela elle continue à s'échapper. encore longtemps  
jusque q. q. f. cette ouverture reste fistuleuse,  
Cette fistule est difficile à guérir, les abcès froids  
des ganglions lymphatiques qui attaquent le  
tissu cellulaire, n'ont par. tous les symptômes de  
le pus fuse. dans les parties voisines. ce que  
M<sup>r</sup> Boyer nomme abcès par congestion, on doit le  
regarder comme fâcheux. Ord<sup>r</sup> les abcès froids  
qui se forment dans le tissu offrent une Eau

Dans le trait<sup>te</sup> de l'inflammation ou suppure aussi les  
repereurs les engorgés les resches et quelque fois  
les toniques ou confortatifs dans l'intention de prévenir  
la gangrene ou de former les progrès.  
on doit être <sup>très</sup> extrêmement réservé et circonspect dans le  
emploi de repereurs

Ordinairement Circonscrite, nous réfléchissons sur (73)  
les gros vaisseaux à Cause qu'ils existent beaucoup.  
De tige cellulaire offrait des pulsations isochrones  
au g. battant. Du poulx. les puls. qui ont lieu.  
dans les abcès ne sont que des pulsations de  
soulèvement. tandis que celles qui ont lieu dans un  
anévrisme sont des pulsations de développement  
peu à peu cette tumeur se rapproche d'avant  
et de derrière elle devient rouge et dou-  
loureuse elle s'élève s'élève et s'élève de son centre  
vers la Circonférence, la base offre des  
Callosités.

Le Phénomène qui se présente dans les  
abcès froids qui se forment dans les organes  
parenchymateux sont très obscurs, lors que  
la maladie est dans la 1<sup>re</sup> période, une  
douleur sourde g. g. f. Continue, un sentiment  
de pesanteur ~~qui est continu~~ <sup>et qui est continu</sup> et qui se confond  
avec la douleur. Sont les phénomènes de la 1<sup>re</sup>

pouride. Les malades se couchent toujours  
d'un même côté ce dernier signe n'est pas  
cependant un signe certain. q. q. f. indépendamment  
du frisson irrégulier avec fièvre. q. q. f.  
la région dans laquelle se trouve le malade  
est + saluante. le + ord. les fonctions de  
l'organe se trouvent lésées et troublées, que ce  
soit un abcès ne venant pas. prochain à la  
surface du Corps, ou ne peut pas être certain  
qu'il y a un abcès froid quand les abcès proxi-  
ment q. a. m. la tumeur qui se forme n'est  
arrondie circonscrite la peau qui recouvre la  
partie conserve grand longueur la peau  
la tumeur, retient l'impression du doigt elle  
paraît œdémateuse infiltrée et q. q. f. au bout d'un  
certain temps cette tumeur paraît se circonscire  
offre de la fluctuation la peau s'annule  
s'aminet et se rompt on pourrait considérer  
un abcès froid, comme du ressort de la médecine  
Général. ne se projettent à la surface <sup>ou tumeur</sup> du corps  
On peut confondre un abcès froid avec un anévrysme  
Vrai., avec un anévrysme faux Conscientif, avec  
une tumeur, une tumeur enkistée, avec une tumeur  
fourmée par des hydatides avec une tumeur anormale  
avec q. q. tumeurs Carcinomateuses qui se



73  
forment dans l'épaisseur du nerf., molle, semblable  
à la substance Cérébrale q. q. f. avec des hernies  
de hydrocèle, mais il faut être ignorant pour la  
confondre.

On distingue les Absorptions de générales  
et locales. Dans les abcès froids la 1<sup>re</sup> peut  
être celle d'absorber le pus pour le faire  
fructifier avec le liniment volatil, les frictions  
excitantes faites sur les vaisseaux qui doivent  
traverser la tumeur, les frictions venimeuses  
dans ceux produits par ce vice, les résications volans  
les Douche hydrosulphureuse. faite par les parties.  
Malades ou voisins peut être. Secondairement on  
se moyennant l'usage interne des Carbonates  
alkalins et des purgatifs salins, l'absorption ne  
pouvant être obtenue, On doit Evacuer. de rassem-  
bler le pus dans le foyer le plus large le plus profond  
le plus précoce et qui se doit vers la peripherie  
du Corps pour cela on applique des ventouses, elles  
agissent de deux manières, mécaniquement et phisique-  
ment cette méthode est la meilleure, elle attirent  
les humeurs vers le lieu ou elles sont appliquées  
elles déterminent une fluxion dans la partie où elles  
sont posées, On pourrait même les mouvoir, car  
Mouvements. serviraient à produire de la douleur

Après l'application des Esquisses l'autour ou  
Coudre la partie avec des topiques chauds, comme  
les Cataplasmes emollients, & après cet avantage  
rien neant les vesicatoires volans, des Senapiques,  
des Cataplasmes maturatifs, Lorsque les abcès  
sont fiftés & profondément & superficiellement  
ou se Contentent d'applyquer les Emplastres d'effou  
dant, Comme ceux de Vigo, l'Empyème ou l'abcès  
Mercuriel, Il ne faut pas attendre que les abcès  
soient froids, s'ils ne le sont pas, on prend ou laisse  
Qu'on les abcès froids de pendant d'un vice serophu  
leux, S'il revient un autre abcès froids, il ne  
faut se l'attribuer, mais au vice interne dont le  
malade est atteint ou parce les abcès suivent q. q.  
accidens avec la pointe Caustique cette opinion est  
la & généralement admise, Suivant l'autre on fait  
une légere piquure. M<sup>r</sup> Mourjolin pense qu'il ne  
faut avoir recours ni à l'un ni à l'autre trop  
exclusivement il faut avoir recours aux figures  
et toutes faites avec la pointe d'une Lancette, d'autre  
abcès formés dans des parties ostensibles, en  
Employant ce moyen il n'y rent pas de  
Cicatrice On emploie le Bistouri de M<sup>r</sup> Genoy  
pour faire les figures, Il y a d'autres abcès froids  
On les marque formés avec beaucoup de difficulté

77  
On ne sent la fluctuation qu'avec peine  
On voit ce phénomène dans les malades vénériens  
Comme les bubons il faut attendre et attendre  
en même temps qu'on les ouvre. Il existe l'abcès  
abcès ou le pus quoi qu. place superficiellement ne  
vient jamais vers la peau, On emploie dans le cas  
la potasse Caustique, le lendemain si la tumeur est  
adhérente, On frotte l'escarre l'abcès étant ouvert et  
il fait recouvrance. Si la Callosité se terminera  
par résolution, la peau est rouge, Si la malade  
éprouve une fièvre légère c'est un signe d'inflam-  
mation. On Couvre la partie d'un Cataplasme  
émollient, Si après la formation de l'escarre la  
base de la tumeur n'est pas sensible, s'il n'y a  
pas d'inf. On applique les excoriants, on fait des  
injections excoriantes en appliquant les maturatifs  
On emploie la Comarostol q. q. f. il faut empêcher  
ces moyens pendant longtemps q. q. f. il faut  
pratiquer des Contourneures.

Il est nécessaire d'ajouter au traitement local au  
traitement interne q. q. f. les moyens sont utiles  
à l'âge de la puberté tout disparaît.

Dans le vice syphilitique l'usage des préparations  
sulfureuses les eaux de Barège de St. Ignace ou  
un mot les eaux qui contiennent des principes  
hydro-sulfureux hydro-sulfureux.

On peut parfois se débarrasser des Circons-  
criptions, les frictions sèches faites sur  
tout le Corps. Lorsque ces abcès recouvrent la  
partie dépressive, y placez un exutoire à demeure  
peut être en appliquant souvent des vésicatoires,  
On ferait mieux lorsque les os sont affectés. Préparez  
le sublimé Corrosif aux frictions, après l'usage de  
préparation mercurielle, on choisira les bois pour su-  
rifier. prise pendant un ou deux mois, puis que  
la maladie est ou opiniâtre. Il y a des abcès  
froids dont la cause est inconnue, dans cet état  
qu'on nomme Carie ou le qui est caractérisé par  
la lenteur de la régénération de.

On donne les bois pour auver le régime anal-  
gésique.

Les abcès symptomatiques,  
Les abcès symptomatiques sont ceux que M. Boiss.  
appelle abcès par congestion ceux là que q. q. uar  
ont nommés tombées ils ont pour Caractères essentiels  
de se former soit dans le ou la qui s'est formée  
ils se présentent assez souvent vers la partie la plus  
inclivée du Tronc ou des membres, constamment dans  
des parties où il y a beaucoup de tissu cellulaire  
ou abondant le quel se trouve en communication  
avec le tissu cellulaire + ou abondant qui se  
trouve dans une autre partie.

On voit les + fréquents dans la région jugulaire, la  
cause <sup>est</sup> ordinairement la suppuration du Corps des  
vertèbres, q. q. fois peut provenir par la carie, la  
suppuration des têtes des Côtes <sup>la</sup> soit même q. q. fois  
à la suppuration de la colonne vertébrale par des épi-  
sités entre les muscles psoas et l'épine au d. une  
profondeur + considérable entre l'épine et les côtes  
général. On en a vu de formes au pourtour de l'aune  
provenant de la carie de l. col. vertébrale assez souvent  
à la région lomb. <sup>gr</sup> prov. d'une Carie superficielle  
des vertèbres q. q. fois même assez rarement derrière le sternum  
à la suite d'un abcès ayant eu son siège au Col. q. q. fois + bas  
derrière l'appendice xiphoïde Le pus passe dans  
l'ouverture qui est derrière cet appendice et qui communé-  
ment avec le torse de l'abdomen, On en a vu de formes  
devant le sternum ainsi qu'au pourtour de la hanche  
à la suite de la Carie de la cavité cotyloïde et de la  
Côte inférieure, à la suite de la Carie de la tubérosité  
sciatique ou on en a vu vers la partie moyenne de la  
cuisse On en a remarqué à la partie moyenne du bras  
à la suite de la Carie de la cavité glénoïde et de la  
Côte de l'humérus, Tout abcès Symptomatique Considé-  
rable en lui-même, ne peut pas être considéré comme fâcheux  
et même défavorable lorsque la maladie se trouve  
au-dessus de la région de l'art.,  
Il est d'un abcès Symptomatique, d'autre cause sont

est moins dangereuse, lorsque le foyer est peu étendu,  
lorsque l'air n'a pénétré pas, lorsqu'il ne vient pas  
de fièvre élique signe commun à toutes tumeurs.

C'est abscès est précédé des symptômes  
qui annoncent une infection chronique et ordinaire  
forte p<sup>r</sup> de certaines par la suppuration, il paraît ordi-  
nairement brusque, sans avoir été précédé d'aucun  
symptôme inflammatoire, il offre une fluctua-  
tion manifeste dans toutes les parties de son étendue, dans  
tous abscès vient la peau conserve la couleur, son  
mode de sensibilité, tout abscès recient et disparaît long-  
temps (Comprime), mais en même temps qu'on le fait dispa-  
raître on voit dans le voisinage de sonner une tumeur  
de grospeu presque égale à celle qu'on vient de comprimer,  
Cela résulte du passage du pus dans la partie, l'aug-  
mentation de volume lorsqu'on donne à la partie une position  
de élève, il augmente encore lorsque les muscles de l'entre-  
tent, le phénomène est q. q. f. très prononcé, q. q. f. il est très  
peu sensible, chez tous les sujets on voit la peau qui  
couvre cet abscès, s'abaisser, rougir & devenir douloureux,  
Si on l'abandonne au la voit soulever, le pus qui s'en  
écoule spontanément paraît toujours très abondant  
relatif au volume qu'occupe la tumeur / est ordi<sup>r</sup> p<sup>r</sup>  
Constant, et ressemble à du petit lait, il a point d'odeur,  
q. q. f. cependant il a une odeur aigre. & quelquefois  
à deux jours après abondamment, mais au bout.

D'un certain temps il continue q. q. fois il se soule  
aussi abondamment. il se deprave, les malades  
maigrissent la respiration se gausse, et il  
croissent la fièvre hétique, les absès se viennent  
d'autant + promptement mortels qu'ils versent  
d'autant + de pus que l'air peut y pénétrer + aisément  
et que les malades sont + faibles, et est + leur indication  
arrestée d'arrêter leur traitement, lorsqu'on  
a vu que les symptômes d'une infection chronique il faut  
la combattre par les verifications dans les veines et.

Traitement local Suivant q. q. praticiens il faut  
les laisser ouverts d'eux mêmes, par ceux qui l'ont  
une fois ouvert la fièvre <sup>croissante</sup> hétique, d'autre  
d'autre il faut pratiquer une ouverture avec un  
croû quant, de façon que l'air ne peut y pénétrer  
et par ce moyen on retarde la fièvre hétique, et  
faute les ouvrir avec le bistouri de Stearn dont  
la lame est croû mince ou avec un  $\frac{1}{2}$  hydrocele  
il est utile de prendre q. q. précautions pour qu'il  
ne soit fait l'ouverture, l'ouverture de la peau  
ne soit pas pratiquée à cause du foyer, des lésions  
ou il peuvent se volume ou la peau s'ouvrir  
et il faut les ouvrir ou pratiquer cette ouverture  
sur la partie inf. de la tumeur, se laisser  
couler le pus cependant si le malade est et

1 atteint de Sympage, on retirerait le  $\frac{3}{4}$  laiv.  
laissera aller la jeau. ou. couvra la part  
avec un emplâtre de Diachylon et s'en suivra  
une date couvris. de Coque, si la  
Cuisse remplit faut de nouveau enfoncer  
le  $\frac{3}{4}$  ou admettra à l'intérieur les autres,  
les Coque, pour prévenir la fistule. hétique  
si l'ouverture reste fistuleuse et si le pus tend  
à la Degradation, On fait des injections  
determinées.

On souffre en attendant beaucoup de  
maladies q. q. f. avec des Exacerbations  
Les humeurs sont malades, q. q. f. même, (mais  
il faut rectifier une grande ignorance) avec des  
accrémentes, q. q. f. avec des hermes.

Des. affec. symptomatiques. ceux  
qui se déclarent tout-à-coup d'une affection  
ou d'une inf. ord. chronique. q. q. se rendant  
instantanément. tout-à-coup  
d'une ou d'une suite de Phlegmasie  
Chronique. Les premiers, du foin ou  
paraissent dans les parties du foin ou  
de la toue de la toue, au point de la toue  
cette est. Organe et la toue à la  
partie interne de la toue, de la toue  
d'une toue q. q. à la toue de la toue



Ce genre se trouve en affectant (83)  
constamment le système q. q. f. en est une  
marque assez aigue chez des sujets faibles,  
ils sont plutôt chroniques qu'aigus, ils  
ont leur siège dans le système.

On trouve aussi de 18 à 25 ans  
de genre mortel d'apoplexie & par suite.  
La première Complication grave est le  
système trachéal, en avant ou derrière  
une ou plusieurs saillies de la poitrine, la  
respiration fréquente & gênée dans la journée  
ont été observés de q. q. symptômes de dysp-  
née q. q. f. chez un jeune homme de  
25 ans d'un tempérament bilieux & qui le  
soir est très sensible, il s'est piqué d'acupuncture  
recidivé. . chez un jeune homme, l'on a  
observé les mêmes symptômes les mêmes  
comme sympathiques? ceux qui se forment  
peu de temps après commencent presque jamais  
avec cet état est (C'est une chose à remarquer)  
siguorité. Considérée en eux même comme  
une affection heureuse parce qu'elle retarde  
une affection mortelle; mais elle peut  
être fâcheuse parce qu'elle annonce une prédispo-  
sition à une maladie grave elle ne  
peut presque jamais en être la cause.

Il faut tout la formation du Sige et face.  
Il faut accélérer la formation du pus. garder  
Cataplasmes. Il faut laisser ouvert la Cicatrice.  
Si elle se développe, si la gaine s'amine  
il en résultera le flux de l'écoulement, lorsqu'un abcès  
se forme qu'avec lenteur, que la peau s'amine  
et de toute sorte alors il faut mieux ouvrir  
et au lieu d'être en faiblesse, une incision  
parallèlement au Naphe en prenant garde  
au rectum. Si il est dans une partie, après  
l'ouverture on ouvre la partie avec de  
la charpie ou un emporte-pièce aglutination  
toute la jour on laisse la partie avec le  
bande et on administre à l'intérieur  
la Boisson Couennable au vice. Tant  
le malade est atteint, si le malade  
meurt. qu'on guérise la fistule, il faut  
opérer par la. signature faite avec le  
Nomb.

Des abcès Rhumatismaux  
Il succèdent presque toujours à un Rhu-  
matisme Chronique.

La Région lombaire, la Partie moyenne  
ou inférieure de la cuisse, on en trouve  
entre les muscles du bras et de la  
jambe on les voit rarement se guérir.

Enfant, mais même chez les vieillards  
plus de forme avec l'âge, il faut en tenir  
assez long pour saisir la fluctuation, ils  
sont q. q. f. exactement circonscrits, d'autres  
paraissent au loir et sont très irréguliers  
plutôt ovales que circulaires ils peuvent  
exister depuis assez longtemps sans que  
la peau s'amincisse. La couleur change, si  
on les abandonne à eux même ils deviennent  
ou le sang s'écoule avec eux par congestion  
ou le rhumatisme existe dans  
la quatrième Vertèbre. Comme produites par  
un abcès par congestion se font sentir dans  
la colonne vertébrale elle même. ils ne  
sont pas précédés de la faiblesse des mem-  
bres inférieurs. Ceux par congestion sont  
toujours suivis de cette faiblesse. Ces dépôts  
sont extrêmement volumineux et s'ouvrent  
ils s'ouvrent et font faire une petite ouverture  
si la tumeur est volumineuse on ne doit  
la rompre en une seule fois. Si la paroi  
peut se facilement on place la lancette  
ou au doigt le plus avec une seringue  
après cela on couvre avec des  
chilons, si on pratiquait une ouverture  
on proportionnerait à leur grosseur.

5) Suite en dressant les facces. On donna à l'interieur le bois pour Exotiques, la Recette de Boudaume, la Recette du fort de Baie de Geniev, les Robs de Sureau, Ces med<sup>ts</sup> tout en même temps Lemignon et Andoufigne, le malade doit porter un vêtement de laine, grand de Boudaume et Andoufigne, et doit même porter un exutoire.

Les autres fornicés par la Création de 9-9  
 vaisseaux excreteurs. Les autres fornicés par la  
 u. Héréditaires. S'il faut le rapporter à ces  
 genres, on doit toujours procéder à une réten-  
 tion de sécrétions, ce qui a lieu pour les  
 autres, urinaux Héréditaires, sans qu'il y ait  
 par l'infiltation d'un sécrétion. Informant très  
 vite 9-9 f. m. Informant très lentement et  
 sans la soit très vite pour cela il faut  
 faut qu'une sécrétion qui n'est pas de la goutte  
 à goutte et rarement très vite sans volume ou  
 elle sont faibles et même mortels, il faut  
 accélérer la formation de l'urine, car il est  
 évident lorsque l'un sent de la fluctuation.  
 Dans un autre fornicé par la Création  
 d'un canal excreteur, et qui l'aurait dans un

liquide irait au devant de l'ouverture & 2<sup>e</sup>  
tut largement pour donner issue le plus prompte-  
ment possible au liquide. 2<sup>o</sup> Pour donner  
issue au liquide de la cavité de la tige cellulaire, 3<sup>o</sup> Pour  
au liquide du vaisseau naturel, il faut l'écarter  
pour en rendre au liquide excreté par  
la tige naturelle, ainsi on empêche l'écoulement  
de l'urine et dans la tige en fait une  
saie.

Les abcs articulaires /

ils sont rapportés à 2 genres cette distinction  
est bien fondée, il y a des abcs articulaires  
articulaires gingivales, ils sont les  
seuls d'origine de diastase ils se trouvent  
ouvert et quand se fait la fluctuation par  
ouverture. Pour en être sûr, pour qu'on  
n'ait rien pénétré pas, on est obligé  
de faire deux ouvertures l'une au côté  
externe l'autre au côté interne de l'articula-  
tion, Il y a des abcs qui se forment  
à l'intérieur de l'articulation, il faut tâcher  
d'obtenir la résorption d'abord et pour cela  
on fait prendre des saies hydropur-  
rues, on enveloppe l'articulation avec  
des plantes tâtées ou se servir de  
moyen par l'application de Noircatures

(8.) Volant. Il existe de la douleur et faut  
faire alterner l'usage d'un excitant et de  
narcotique et du Calme, si le per-  
s est par resorbé et faut pratiquer une  
Ouvrière, q. q. Rationnel propose des  
detachés d'une articulation du membre le  
repos avant et après l'opération.

### Le. Obleu Sanguin

Il se voit à la suite des contusions, à la  
suite de plaies profondes, de lésions  
de l'aiguille, de l'augmentation, lorsque  
la ligature se trouve sur vaisseaux et après  
de faite, lorsqu'on a souffert beaucoup  
de sang, et qu'on veut obtenir une réunion  
par la suture.

Il se voit de deux Especes, le sang est infiltré  
ou épanché et se forme très rapidement  
peu de temps après la rupture des vaisseaux  
Il se voit rarement très étendu et il  
change de couleur de la peau, lorsqu'il  
est profond et il ne se change pas  
dans l'origine il se voit peu douloureux  
et ne sont accompagnés que de peu de pesanteur  
lorsqu'il est ancien et le Complètement  
d'un et peuvent devenir très douloureux.

Il se termine par résolution, par  
suppuration même q. q. fois par gangrène  
q. q. auteurs ont pensé que quand il se  
termine par résolution d'un des cavités  
ou y trouve du Cailler Noir, on tâche  
d'obtenir la résolution, en le couvrant avec  
du Copieux repereuse, avec l'eau froide,  
la neige, la glace pilée, ou la seconde Action  
est repereuse par la compression, ou la  
Certaine tant qu'il n'y a pas de l'ulcère  
On reconnoît qu'il se termine par résolu-  
tion lorsque la peau devient jaune la  
tumeur disparaît et la partie peut exécuter  
son mouvement, si après quinze jours  
la tumeur augmente. On peut être Certain  
qu'il se termine par suppuration  
on fait une petite ouverture et pour empêcher  
une mauvaise suppuration on se servira  
de la compression, si on attend & tard et la  
forme du pus. La partie ayant perdu sa  
sensibilité on peut pratiquer une plus grande  
ouverture. après on exprimera avec force tout  
le sang on pansera très promptement & an-  
gineusement, après que l'air n'y pénétrera pas.  
Après q. q. auteurs ont couru la partie

90) avec des Compresses trempées dans  
de l'eau de vin Camphrée, sur des Tâches  
On remplit le Végot de charpie et que  
le pus a pris un bon Caractère, On le  
panse ordinairement, lorsque sont les  
grands ou fatigues Amputation

Vela Gangrene



Cable de Matière  
Contenue dans le 1<sup>er</sup> volume de  
2<sup>e</sup> Tome.

---

1 <sup>er</sup> Cahier	De l'ergasjèle	1
idem	De l'arsaele	22
idem	De l'autre Benin	23
idem	De l'autre malin	29
idem	De l'phlegma	30
2 Cahier	Des abeu	31
idem	abeu froid	71
3 <sup>e</sup> Cahier	abeu Rhumatismes	84
idem	abeu articulaire	87
idem	abeu sanguin	88
	fin.	